



來信請多
利用明信片，
信中免除客氣
話，寫明姓名
住址，信的正
面註明「農問」。

防治星天牛害蟲

可用地特靈粉劑



【問】：木窗內附寄檸檬害蟲標本，所寄的是幼蟲，它寄生在樹頭表皮內。至於成蟲已鑽入樹心，無法捉到，請指示蟲名及防治法。(雲林縣李信男)

【答】：所附標本為星天牛幼蟲，可以在四月底樹根附近塗五十%地特靈可濕性粉加水一〇〇倍，防止其產卵，現在只有用手及鐵鑿等捕殺之。(陶家駒)

防治柑桔象皮病

用石灰硫黃合劑

【問】：我的柑園裡所植幼齡柑樹，曾發現柑葉有深紫色病狀。有此種相的柑樹好似較其他的發育遲鈍，未知叫什麼病名？同時患有此病的葉，大多數會向下彎，係患病或因施肥不當，如何治療？(苗栗縣謝全源)

【答】：查此乃發生在葉上之象皮病，此病應在六、七、八月中各撒佈石灰硫黃合劑壹百倍到八拾倍一次，可防治此疾。又撒佈此藥時勿在中午時以免藥害。可濕性硫黃粉亦可用。(劉鑑鑑)

韭菜有銹病為害

可噴大生水溶液

【問】：本信內附韭菜病書標本，用什麼藥防治比較適合？請指教。(彰化縣許榮心)

【答】：據寄來韭菜病害標本係被銹病所

為害，可用大生七十八(四〇〇倍)水溶液，每隔十天噴射一次，至收穫前一星期為止。(簡錦忠)

韭菜留種前預防害蟲

可噴D D T 乳劑等藥

【問】：一、全年開花韭菜留種，未知何時比較好。二、留種前預防害蟲，用什麼藥？(彰化縣許榮心)

【答】：一、十一月開花之花菜最適於採種，因為此時氣候乾燥種子收量品質都較佳，且採收之種子適於春季之播種栽培。

二、可噴D D T 乳劑或馬拉松乳劑，如田間有一份係採收供食用，最好噴馬拉松，較為安全，但噴藥後一星期內請勿採收供食。(陳文郁)

颱風後穀粒容易受傷

應注意預防稻熱病等

【問】：請詳解年前數期一颱風前後稻田措施一文內所述應該預防病菌侵害問題。不知變色谷是何種病？又不知應用何種藥劑？(雲林縣廖欽)

【答】：一、變色谷的原因有二，一、由於曬傷或天候不良(北部第二期作常較南部變色谷多)所引起的。二、由於稻熱病菌或胡麻葉枯病傳染所引起。如曬傷所引起，因曬傷後很容易被稻熱病菌或其他病菌侵入，所以往往也會引起稻熱病或胡麻葉枯病，以致產量大減。

二、農藥名稱因篇幅關係雖未載明，惟可參照農年第十一卷七期「水稻病蟲防治新

永光農藥 TRADE MARK 信用最好

政府檢驗合格
登記號碼第007號

ハラチオン
巴拉松
乳劑 47%

E-IA
P M
乳劑 50%

マラン
馬拉松
乳劑 50%

エンドリン
安特靈
乳劑 19.5%

555 EM 原字 別號 兼等

水光的農藥 確實好

請用水光的 砂屋藥

進口各種名牌農藥

永光農化工廠

台中市成功路276·電話4661·

廉老好 價格子用 牌子信用

大地養雞場

臺灣首創科學養雞法 電話臺北 31444

日商 大地養雞場 電掛 FLYWHEEL

士林鎮福林路三六八號 信箱臺北1604號

郵儲劃撥2766號

來克亨	AA級	3500	美日直接進口第一代附血統書
盧花	A級	1600	美日直接進口無附血統書
	B級	900	大地第一代鑑別母雞的
紐漢西屋	B級	600	同上各種純種無鑑別
	30天中雛	2400	初心者福音不要育雛辛苦雞痘
名古屋	60天肉雞	4000	新城預防完畢
	肉雞	另議	拔雄各種第1代之交配種
三河	可肉秀純種公母1對	15000	肉用專用美國新種

本場試驗結果可用種公×紐漢西=F.I 60天到二臺斤
郵資三元或訂購者奉上育雛要領一份