


木薯為深根作物，種植之先，宜深耕，以利生育。在傾斜地，種植時不必先起畦，待種植後發芽再培土成畦，行距三至四尺，株距二至三尺，每公頃可種九〇〇〇至一八〇〇〇株。

樹薯加工廠在中部南投甚多，臺北尚未見到。但種植較多可自行設廠加工。收購價格可逕函南投農林廳查詢。

新墾肥沃地初年不施肥，亦有相當收量，為保持地力不宜連作，且應施用肥料為宜，每公頃基肥施用量，堆肥一萬公斤及草木灰三百五十公斤。追肥人糞尿三千六百公斤。基肥於整地時施用，追肥於株高達一至一·五公尺時分二次施用。施追肥之前，應行中耕除草，施肥後即行培土。生育中如為風雨吹倒，需行扶起，使迅速恢復生勢。(繆進三)

為使茶苗發育加快
可用尿素液噴葉面



十月播種之阿薩姆茶苗，目前苗高十五公分至二十五公分不等，是否發育正常？已兩週無落雨，近日除草部份，不多幾日便有黃變現象，早期除草是否有害？為使發育加快及免有黃變部份，可否用尿素噴射於葉面？尿素加水幾倍？

二、奉上樣本，請指示病蟲害名及防除法。(花蓮縣杜雲卿)

【答】：一、四十九年十月播種之阿薩姆茶苗目前苗高十五公分者發育似嫌欠佳。二、早期除草，應淺，不但可以減少雜草影響茶苗發育，且可以切斷土壤毛細管作用，減少土壤水分蒸發。所指除草後有黃變現象，可能為除草時有傷及幼根或幼莖及鋤頭入土過深所致。三、所用鋤頭最好改用小而字把，除草可減少損害茶苗幼根，如該地無白蟻為害，苗床舖草既可減少雜草，且亦可以防止土壤水份蒸發及苗床土壤之沖刷。四、以可用〇點六%尿素溶液噴施葉面(一公升

水加尿素六公分)。五、寄來樣本可能為切根蟲為害，可以四十%阿特靈可濕性粉加水二百至三百倍平均洒施苗床(用粉劑雖較適於茶區惟因目前正值早期莖葉深入土中)。(胡家俊)

桃樹的繁殖可行嫁接
用苦桃實生苗為砧木

【問】：一、桃樹繁殖是用實生苗或用是根？
二、種子怎樣播種及何時為適期？
三、用梅做砧木怎樣？
四、播種後要經過多少期間可接？(南投縣宗洋)

【答】：一、桃之繁殖，普通採用苦桃之實生苗為砧木，行嫁接。
二、苦桃種子在六月中旬至七月上旬間成熟，在此期採種子後即播亦可，但該種子仍需待至翌年一月才發芽，一般可把種子貯藏於乾燥砂中，至十一月始播種，覆土二公分，發芽率約三十五%。
三、彰化縣一部份人士用梅作為砧木接桃，而有稍增加耐濕性之說，但未至普遍採用。
四、十一月播種，於第二年一月發芽，同年十二月(冬至前後)即可嫁接。(翁仁敏)

孟宗竹須常施肥料
繁殖宜用母竹栽植



【問】：一、孟宗竹在奮起湖附近(寒冷地帶)的竹筍(冬筍)都較別地方慢，是什麼原因？對氣候水土有沒有關係？
二、孟宗竹施化學肥料有效嗎？用什麼肥料有效，何時施肥是對竹仔或竹筍有效？
三、以怎樣繁殖成活力最高？
四、須注意那些事項？(嘉義縣翁盛慶)

【答】：一、奮起湖附近海拔較高，氣候比較寒冷，所以該處的冬筍萌發，比較別地方為遲。二、孟宗竹因為每年發多量的筍，故須常施肥，以增補其養料，尤以氮、鉀為重要。化學肥料之肥效雖大，但亦須施用厩肥堆肥落葉綠肥垃圾等，以改良土壤物理性

稻紋枯病需用「多穗」

「多穗」三〇〇〇倍稀釋液，每公頃一〇〇〇—一二〇〇公升，於插秧後四〇四五天(分蘗最盛期)施用一次，施藥時以噴射稻株下部為主。隔兩星期左右(孕穗盛期)再施一次，藥劑應噴射全株。

現貨供應

正豐化學公司
東益貿易公司

臺中縣霧峯鄉草湖路二號
臺北市天水路二號之四



請認明拜耳商標為品質高超信用可靠之標記

看！最新的農藥

英國植物保護有限公司榮譽出品

福施芬 50號

說明書索備



使用福施芬
保證年年豐收
殺虫力最強 無論
任何害虫一噴即滅

原封現貨隨時供應

包裝 100cc 500cc

與代理 英商卜內門洋碱股份有限公司

台灣總經理處

元山貿易有限公司

台南市復興路十巷四十二號