

質，而促進鞭根之蔓延並早些發箭。關於施肥的時期，如用速效肥料則可於發箭前二、三週或發箭後施之，若用遲效肥料則須於十至十二月間施之。三、繁殖用母竹栽種為適宜。四、此外，如除草填土覆草病蟲害防治等，均為應注意之事項。(黃秀周)

南投山地區域
可以飼養山羊



什麼病？如何治療？

二、羊仔經常流鼻涕，及經常荷稀尿，是什麼原因，怎樣防止與治療？

三、山羊如何飼養肥大？

四、羊仔生病，是否有特效藥醫治？有何急救辦法？

五、南投縣山地區域，是否適合飼養山羊？(南投縣李連魁)

【答】：一、羊仔突然腹部膨大，口流泡沫，可能是患腹脹病，當時應立即以薄荷腦，芒硝，稀鹽酸等內服，同時以乾草在腹部不停地用力摩擦，必要時注射強心劑，或可救活。二、下稀糞是腸卡答兒，必須投以健胃藥，如龍膽末等藥內服，或飼養中加餵歐雞肥。三、要使山羊肥大，必須注意飼養，首先要檢查該羊有無慢性病或寄生蟲，如真正健康，則以營養分較良之飼料餵養，再使之充分吃肥嫩之青草，如此飼養，則易發育肥大。四、小羊生病之特效藥醫治，範圍太廣大，因為各種病有各種之治療藥品，各種病的急救法也有不同，很難回答。五、南投縣山地區域可以飼養山羊。(黃立羣)

母豬有死胎的原因

主要為遺傳營養等

【問】：一、母豬每次生十二至十五隻，但生產小豬仔時，每每生下三分之一或三分



之二之際，即會停止，一至二小時，方再繼續生產，不過此時生下的小豬皆頭變會死，次者尚好，連續三兩隻之後，又會停止，以後所生者皆生下即死(分娩三小時以內所生者都無問題，但以後生者都死)。

二、母豬分娩後，食慾不佳，有時二至三天不食，全身常會發抖。

三、母豬分娩以後，若食慾不振，注維尼微素或盤尼鏈微素，消炎，(二百斤左右者應注多少數量)不知可否？

四、肉豬約生長至一五〇斤左右時有時後脚一肢無力，無法起身，食慾不佳，是何原因？(花蓮陳清幸)

【答】：一、據你所說的情形，可能是因為有死胎的緣故，致生產時間延長。死胎的原因很多，主要者為遺傳，營養或因胎數過多所引起。

二、母豬因生產用力過度，至為辛苦。故產後頭數日常胃口不佳，這是不緊要的，全身間隙發抖也是疲倦之表示。產後應多給飲水，濃厚飼料應逐漸增加，至一星期或十天才給全量。

三、一般情形無須治療，請獸醫檢查體溫如有升高，則請獸醫處方診治較妥當。

四、肉豬生長約一五〇斤是達可屠宰之體重。後脚一肢無力可能受傷所致，請檢查有無傷口，有傷口時應用濃的過錳酸鉀溶液洗傷口，再塗撒消炎粉即可，傷癒後，胃口自然恢復。(李登元)

* * *

- 陳雲 廖水德 李龍森 林火星
- 張阿寶 呂永安 陳欽炳 涂川
- 張政雄 林崇喜 吳石獅 柯泉洲
- 章聰明 董如鑫 曾征夫 郭火木
- 邱福壽

以上各位農友的來信，已轉請專家答覆，請候本社回信。

可樂與加裕 (コロイカル)

家禽、家畜、蠶魚、營養飼料素、強壯保健劑

製造元 白石カルシウム株式會社

強力安維素 (ノキサリン)

鴨之球蟲症治療及預防家禽霍亂 (コレラ) 之預防
鴨之感冒咳嗽治療，豬之赤痢 (出血性下痢症)

強力寧禽片 (ヘルミノツク錠)

出品廠 大和化學工業株式會社東京工場

美耐元 (ミネゲン)

理想的綜合強力礦物素、強健多產、激滅廢鷄、促進發育、預防啄毛、防止腳弱、防止軟破卵

製造元名古屋 ミネラル飼料株式會社

日本原裝魚粉蛋白質成分50%，南美洲65%以上

日本魚精、切菜機、鷄糞乾燥機

臺灣總代理 東盈實業股份有限公司

地址：臺北市迪化街1段42號



豐年牌農藥

◎檢驗合格登記證、農字第001 002 003號
興農化學工廠有限公司
公司：臺中市中山路一七五巷24號
電話：二六一九·三九六五
工廠：臺中縣大甲鄉內新街五九號
(省農會後隣) 電話：4688