

的發易容猪仔



症血貧性鐵缺

元培季

猪的貧血症有很多種類，缺鐵性貧血就是因缺乏鐵與銅等礦物質而引起的一種，飼養在水泥地上的仔猪較易發生。因為本省的猪舍，多已改鋪水泥，所以該病的發生，也就較過去為嚴重，請農友們多加注意。

猪的貧血症種類很多，有慢性出血性貧血、溶血性貧血、再生障礙性貧血，及缺鐵性貧血等數種。

預防

使母猪在懷孕期中口服鐵劑，並不能影響仔猪組織內的含鐵量，預防本症的發生。

母猪產前口服鐵劑，也可增加初乳內的含鐵量，對於正常乳中的鐵份，則仍無影響。所以，餵給母猪足量的鐵，並不能有效地預防仔猪缺鐵性貧血症的發生。

圈飼於水泥地的仔猪，使和泥土接觸，自泥土中獲得足量的鐵和銅，則多可預防此類貧血的發生。或用鐵劑給仔猪口服，也是有效的預防方法。所用鐵劑普通為硫酸亞鐵溶液，用法請參看下節。

治療

每天給連泥帶根的草，雖不完全可靠，但仔猪常因此而避免貧血。

或每隔天用硫酸亞鐵溶液塗於母猪乳頭上，使仔猪因吮乳而獲得鐵分亦可。

徵狀

仔猪三星期大小時，開始發現缺鐵性貧血。猪營養情形外表良好，但皮膚及粘膜呈蒼白色，肌肉無力，呼吸困難，疲勞。

有些病猪很肥，營養情形也良好，但突然會死去。有些病猪雖能存活，但猪體瘦弱，健康不佳，死亡率很高。

病因


缺鐵性貧血病，是由於仔猪圈飼於水泥地面，仔猪不能自泥土中獲得足夠的鐵和銅而引起的。

母乳中所含鐵量很少，仔猪自母乳中難能獲得足量的鐵和銅以供需要，所以易發生貧血。

此外，用硫酸亞鐵溶液給仔猪個別口服亦可。二星期大後，每星期口服一次，但是不宜過多，以免引起中毒。

註：一夸脫為一二·七公斤。一磅為四三·五九二公分。一英兩為二八·四公分。

若要配合觀光年
第一衛生着注意



在現的平和界世
來起與業事光觀
，果無是入收加增
。愛人人會社榮繁



，(業事)註代的光觀展發
，意注要生衛一第
，(疾吐地隨可不)吐白黑通喉嚨嘴
。顧着咱生衛共公



，(搬小)食鍋賣(堂食)頭店論無
，捉(勤)力背愛着(繩套)神雨
。鐵(賺)趕大(多)座若願主