

草雜種幾的見常園菜

吾 靜 謐

菊科雜草

上期本刊登載「菜園常見的幾種雜草」的第一節以後，我們收到很多讀者有關該稿的來信。其中的大部份，都對該稿圖文對照的方式表示贊同。據編者所知，本文作者對雜草研究多年，爲了撰著本文，曾親自到各地菜園採集標本。文中以植物學上的「科」來分類，雖略涉專門，但爲了查考的方便，還是用這種分類的方法。這次介紹菊科等雜草，歡迎讀者們繼續來信討論這類題材處理的方法。

多年生，以種子繁殖，夏秋季開花，花很小很多，淡紅紫，爲穗狀花序。

舊香薷

全株有粗毛，葉子對生，爲心臟卵形，葉緣先端爲鈍齒，夏季開花，花小，白色或淡藍色，苞葉細長形，一年生，以種子繁殖。

紫花舊香薷

圖九：土香草

莎草科雜草

和「舊香薷」很像，但葉子較寬，爲心臟形。花較大，爲淡紫色。一年生，以種子繁殖。

黃瓜菜

又叫做「黃花菜」、「黃鵪菜」、「雀巢草」及「山波稜」等。葉子有點波稜，由基部簇生。春季開花，花小黃色。二年生，以種子繁殖。

莎草科雜草約有十至二十種。從外形看來，和禾本科雜草很難區別，因此許多人對於禾本科及莎草科分辨不清。大體來說，莎草科的莖，由橫斷面看來是三角形，很少圓形，而禾

圖十：荆三稜

圖六：艾

圖七：舊香薷

圖八：黃瓜菜

本科莖的橫斷面是圓形的。莎草科的葉也是細長的，但葉鞘通常是管狀，並將莖包在中間。

土香草

又叫做「香附子」，多年生，是莎草科中很有名的雜草，菜園中很多。葉細長，比較硬。花深茶褐色，多在春季開花，以種子及地下莖繁殖。

荆三稜

又叫做「沙草」，一年生，在夏季開花，花爲黃色或褐色，從圖片上可以看到花下面的苞葉很長，這在莎草科雜草中，有很多有這種特徵。以種子及匍匐莖繁殖。

無頭土香

又叫做「水蜈蚣」或「金鈕草」，多年生，夏秋季開花，花爲球形，綠色或褐色。以種子及地下莖繁殖。

單頭水蜈蚣

和「無頭土香」很像，不同的地方是顯的龍骨上部有半月形的雞冠，並有紅色腺點。多年生，夏秋季開花，花爲綠色，以種子繁殖。

圖十一：無頭土香

花一樣，不過有的很小而已。花瓣有舌狀及筒狀兩種。

艾

艾比較好認，因爲葉子很像菊花的葉子。艾葉的正面爲深綠色，背面密生白色毛茸，遠看時背面顏色很淡

