

我用電石處理鳳梨的經驗

南投縣中寮鄉 廖慶章



我家種植鳳梨，至今已三十餘年，成績都很不錯，尤其從四、五年前起，應用電石水處理鳳梨，更提高了鳳梨栽培的利益。

下面就把我應用電石水處理鳳梨的方法與經驗，介紹給各位參考：

電石水的調製法

準備大水桶一個，裝八、九分滿的清水，將一大塊電石投入水中，等到水色變乳白，水面形成一層水鏡，並有水泡出現時，隨即將電石拿出（拿出的電石，應放置乾處，以備下桶使用。）

施用前，再準備大茶壺一個，壺中投入雞蛋大小的電石一塊，將上述電石水倒入茶壺中，立即拿到鳳梨園去施用。

施用方法

每株鳳梨施十立方公分（cc）左右，但是過小的幼株不宜施用。雨後半天即可施用。施用後六、七小時遇雨可不需補施。施用中遇小雨，仍可繼續施用。這樣施法，每公升電石，可以處理二千五百至三千株的鳳梨。

效果

施用後至開花的日數如下：①春季五十天左右，②立秋後七十天左右，③寒露後九十天左右，④立冬後一百二十天左右。

也就是說，夏季鳳梨在雙十節前後十天施用，則開始採果的時期約在國曆的五月，盛出時鳳梨工廠又已開工，始終可以賣得很好的價錢。

又冬季的鳳梨，在清明節前後十天施用，則可在國曆九月採收，避免黑



友農章慶廖

〈識知小業農〉

△嫁接成活的良否，主要由下列四種因子控制：①砧穗的親和力；②嫁接技術；③嫁接時期是否適當；④接後保護管理是否週到。植物生長素通常用在促進扦插插穗的發根，或處理移植的樹木，促它快生新根，少應用在嫁接上。（蔡）

△「臺中在來一號」是適宜於第一期作栽培的在來稻品種。第二期在來稻早生種，則以「早矮仔」品種較好。如在第二期作栽培「臺中在來一號」，可能受浮塵子嚴重的為害。（余）

△肥料全層施肥的優點為：①肥效高而保持力久，②肥份易被作物吸收，③節省勞力，提高產量。（李機）

△硫酸銨與灰類混合後，硫酸銨中的「銨」成份，易因灰類的鹼性作用而變成「銨」氣體飛散，這就是硫酸銨不能與灰類混合施用的原因。（李機）

農友的一大福音

科學造福人類的新時代來臨了！

●增產大革命●增收的原動力●

請選用

美多收液劑

メタリック

能使農作物提早收穫，改善品質，增加產量，增強抵抗病害侵入，保證效果確實。

欲使農作物根部強健，確保着花着果等，請將「美多收」混合「愛多收」使用效果加倍！！

本劑與肥料相同是愛多收農家必備之藥品。



製造：日本旭化學工業株式會社榮譽出品

臺灣總代理：臺實貿易股份有限公司

臺北市太原路四四號 電話：45437 41119

總經銷：榮興行

臺北市西寧南路15號 電話：32169 32396

九種複合微量元素

メタリック

美多收

註冊商標

中臺字11649號

成份：鐵、銅、鋅、鎳、錳、鋅、鎂、鉬、硼多種複合葉面撒布劑（使用時需加展着劑）

◎人畜無害◎

純●
日●
本●
原●
裝●
現●
貨●
供●
應●

經銷處

- ① 惠農行——宜蘭縣羅東鎮中正路
- ② 東隆行——新竹縣新埔鎮中正路二巷12號
- ③ 華隆行——新竹市公園路64號
- ④ 美隆行——臺中縣霧峰鄉中正路327號
- ⑤ 商美行——彰化市長壽街61號二樓
- ⑥ 慶源行——彰化縣員林鎮中正路93號
- ⑦ 順源行——彰化縣永靖鄉永西村63號
- ⑧ 永豐行——雲林縣斗南鎮新興街30號
- ⑨ 嘉義縣農會——嘉義市中山路192號

- ⑩ 建南農藥行——嘉義市中山路452號
- ⑪ 年豐農藥社——嘉義縣義竹鄉六柱村199號
- ⑫ 豐益行——臺南縣新營鎮中山路192號
- ⑬ 臺南縣農會——臺南市中正路51號
- ⑭ 慶雲西藥行——高雄縣鳳山鎮第一市場內
- ⑮ 屏東市農會——屏東市公勇路95號
- ⑯ 豐豐農友行——屏東縣潮州鎮中山路54號

及各地農藥服務社、農會均有經售