

五、蕃茄開花結果時，下部葉片捲起心部萎縮，只有空莖，此是否為病象？何因？如何防治？

六、蕃茄多旺要如何處理？有否必要？（桃園沈有福）

【答】：一、①水銀波爾多液乃水銀劑與鹽基性硫酸銅合成的。②波爾多液乃石灰波爾多液之簡稱，正式之名字為石灰波爾多液。二、石灰波爾多液是有毒的，噴射七天後，收穫後用清水充分洗滌後即可。

三、「富利農」之效果尚未有試驗資料可參考。

四、「收綠生」亦尚缺乏試驗資料。

五、未見標本無法斷定。

六、蕃茄多旺之功效，請參閱本刊第八卷第十七期。（簡錦忠）

茶黑姬捲葉蟲為害

可噴射富賜靈防治

【問】：茲附寄茶樹害蟲標本，請檢定為何種害蟲，並將防治方法見告。（南投水里進榮）

【答】：一、所寄標本為黑姬捲葉蟲之為害，其防治方法：①噴射富賜靈乳劑加水稀釋一千倍，噴藥後經過一星期才可採摘（請向縣政府茶葉保護輔導會報告）。②提早採摘。二、因為這種害蟲均為害新芽，使用其他藥劑很容易影響飲茶人健康或品質，務請注意，希與南投縣政府茶葉保護輔導委員會連絡。（胡家俊）

賜保根供種子消毒用

不能防治黃麻炭疽病

【問】：茲因黃麻種子於播種前未經「賜保根」之消毒，是否可將此藥用在幼苗期噴撒以防治「炭疽病」之發生？二、黃麻每公頃生產產粗麻及幼麻之平均產量多少？（臺中市賴逸）

【答】：一、賜保根係粉劑，不溶解於水，只能供作物種子拌種消毒用。在黃麻幼苗期，不能噴撒防治炭疽病。二、黃麻每公頃平均產量，粗麻約二五〇〇公斤，幼麻一八〇公斤，精洗麻一四〇〇公斤。（賴銘立）



粗糠未腐或燒成灰

不能當作肥料使用

【問】：一、稻穀磨出之粗糠未經分解即拿來做基肥，是否對水稻生長有影響？二、以同樣數量之粗糠未經分解即使用，與經過燃燒後成草木灰才使用，是那一種肥效高？三、粗糠做肥料以那一種施用方法，最為理想經濟？（桃園縣倪來壽）

【答】：粗糠（谷壳）未經腐熟分解或燃燒成灰，不能當肥料使用，大量施下於水田時水稻生育受阻，如果燃燒成灰之後施用時，可供給農作物所需要之鉀素，對增加收量頗有益處。（吳啓東）

紫雲英產量比魯水高

蔬菜園可種植作綠肥

【問】：一、魯水與紫雲英那一種適於蔬菜綠肥？據書刊記載魯水所含磷質及鉀質均較紫雲英高，不但為菜園之好綠肥，尚能利用種地或平頭，是否比紫雲英為佳？三、土壤酸度表在臺北一般儀器均無法買到，煩請代詢有關機關，究應在何處購買？錢不知需要多少？（基隆市陳德明）

【答】：紫雲英在本省北部冬季栽培時，每公頃之青草收量很容易達到二萬公斤。可是魯水雖為良好之綠肥作物，若青草收量未能達到一萬公斤（每公頃）時，對於單位面積當中之磷、鉀含量，自然不如紫雲英栽種時之多，尤其綠肥之栽培目的注重於耕地裡之有機質及氮素含量。地瓜田或蔬菜園仍可種植紫雲英來做綠肥。土壤酸度表不知何物？是否想知道貴地之土壤酸度？一般地說，北部之丘陵地帶土壤是酸性或微酸性，沒有鹼性土壤。（吳啓東）

竹林被颱風吹襲受害

須多培土並多施肥料

【問】：（一）五、廿六颱風損失極大，本人所栽麻竹一八二株亦都受害，但當竹筍臨生產之時期受襲後應如何處理？（二）竹被

武田老牌 最新農藥

武田滅爾

武田メル

水稻稻
熱病及各
種果樹蔬菜
細菌病最新
特效藥

武田安特靈

武田エンドリン

乳劑 19.5%
水稻，旱地作
物及果樹害蟲
之防治

武田徽素

武田マイシン

水稻白葉枯病，柑
桔潰瘍病，白菜軟
腐病，馬鈴薯蕃茄
疫病特效藥

武田飛佈達

武田ヘプタ

粉劑
適於缺區
壤害蟲（甘
土象鼻蟲，金
蟲，蝼蛄，黃
針蟲，螻蛄，
切根蟲，守
瓜等）之防
治

日本武田藥品工業株式會社

臺北出張所

臺北市中山北路二段二二號之二 電話 49344 49345 49346

輸入元

立大貿易有限公司

臺北市太原路五五號三樓
電話：48170 41108