

澈底驅除豬的體內寄生蟲！

——宣欽游——

豬蛔蟲、豬鞭蟲、豬線蟲……等，都是豬的體內寄生蟲。豬經體內寄生蟲寄後，生育受阻，甚至死亡。又據專家的報告，豬蛔蟲與豬鞭蟲，和寄生人的蛔蟲與鞭蟲是同一個種類，所以，在公共衛生的立場上，也值得我們注意。

本省氣候高溫多濕，適於豬體內寄生蟲的繁殖。據統計，本省豬蛔蟲的寄生率，高達七成左右；感染其他體內寄生蟲的，也很普遍。

豬體內寄生蟲會使豬的生育受到阻礙，甚至死亡，又據專家的報告，豬蛔蟲與豬鞭蟲，和寄生人的蛔蟲及鞭蟲是同一個種類，所以，在公共衛生的立場上，也應注意。

常見的種類

在本省常見的豬體內寄生蟲，有下列的幾種：

豬蛔蟲 公蟲長十五至二十五公分，母蟲長二十至三十公分。經口感染。症狀：生育受阻，誘發肺炎，咳嗽，成蟲迷入胆管即呈黃疸，分泌毒素即呈神經症狀。

豬鞭蟲 經口或皮膚感染。症狀：發育不良，下痢，貧血，發生氣腸，疝痛。

豬線蟲 公蟲長三至四公分，母蟲長三至五公分。經口感染。症狀：貧血，發育不良，大腸炎，慢性下痢。

豬腸結節蟲 公蟲長八至十公分，母蟲長十一至十四公分。經口感染。症狀：下痢，發育不良。

豬肺蟲 公蟲長十六至十八公分，母蟲長三十至四十二公分。經口感染。症狀：枝氣管炎併發肺炎，發育不良，咳嗽，呼吸困難。

豬腎蟲 公蟲長二至三公分，母蟲長三至四公分。經口或皮膚感染。症狀：仔豬發育

防止感染的方法


注意環境衛生 豬舍內或運動場排水不佳，敷草汚濕，都易使感染寄生蟲。因此，豬舍內外必須排水良好，並要保持清潔。

豬糞尿要製成堆肥充分發酵 蛔蟲卵生命力很強，在外界能生存半年至一年之久，但最怕高熱，所以，豬糞尿必須做堆肥充分發酵，使蟲卵完全死滅，才可撒出施用於田園。如果未經充分發酵而施用，則易由飼料作物再傳染給健康的豬。為安全計，豬用的青飼料作物，最好施用豬以外禽畜的糞尿。

每年更換運動場蓄土兩次 沒有鋪水泥的運動場，應每年更換蓄土兩次，以便將蟲卵去除（蚯蚓也應去除）。同時，應使床及地面傾斜，使排水容易。

藥劑 撒佈

含內外及運動場，應撒布藥劑，如BHC粉，三石炭酸水，或五%來蘇液，以殺滅蟲卵及幼蟲。據報告，BHC粉劑



位部生寄的蟲生寄內體豬種幾

農林當局出告示
各種農藥勿亂施


欽炳文
老金園



，中藥農性毒種各
，松拉巴凶藥最一第
。終送險了吃哥王

，蛋實確藥農前目
，平害蟲農投戶家家
。增物作患無備有

，哥王名農菜山龜
，多類種菜德哥王
，說灌勤草除肥施
。何奈無害蟲着為



條開的生發蟲生寄與齡月猪

△農作田的雜草，應及早用人工排除或撒佈殺草劑殺除，如日子過久，雜草抵抗力增強，除草工作就較費工。(林)

△雞痘固然有時會使雞隻瞎眼，但是雞痘的症狀，是在其他沒有羽毛的地方發生痼塊，如果沒有，就不是雞痘。不是雞痘而有瞎眼的情形，是可能因患一感冒病(洛布病)，此病常使雞眼流淚、腫脹，最後可致眼瞎。有此情形，可應用硼酸水(2%溶液)洗眼，最宜用硼酸水(2%溶液)洗眼，每日處理六、六日可治癒。(李)

猪的月齡	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

補給維他命甲 哺乳仔猪生育後期及離乳後的仔猪，必須供給富營養分的飼料，並給魚肝油、牧草、蔬菜、野草等，以補充維他命甲，維他命甲可增強身體抵抗力，幫助甲狀腺機能。

注意分娩前後母猪的衛生 哺乳中的仔猪，猪最容易感染寄生蟲，因此，哺乳期間應特別注意衛生。分娩前的母猪應予洗澡，尤其是乳房部位，應用肥皂水洗淨，然後放入已實施火焰消毒的猪舍。剛出生的仔猪也要收容在消毒過的竹籠內，等待仔猪全部生產，胎膜排出後，才放給母猪餵乳。哺乳期中，母猪所排泄的糞尿，應隨時清除，離乳前，仔猪舍也須消毒妥善。

撲滅幼蟲甚有功效，但對未發育的蛔蟲及鞭蟲卵無效，而應用後述的火焰消毒殺滅。

分娩前的母猪舍一定要實施火焰消毒 母猪分娩前，先用開水洗滌猪舍的牆壁地面和飼槽，然後請鄉鎮區農會派員來實施火焰消毒。火焰消毒的熱度很高，可將舍內各種蟲卵、幼蟲完全燒死。現時本省已在二百七十個鄉鎮區農會實施該項消毒，免費替農友們服務，請各位農友多多利用。

△農業小知識▽

母猪及離乳的仔猪，一定要經過猪瘟疫苗預防針，並驅蟲後出售，以確保仔猪安全，尤其是防止蟲卵的散播。買主也應在購入後二個月時再施行驅蟲一次。


驅蟲時，須要注意下列幾點：

- ① 使用經政府核定確實有效的藥品。
- ② 採用投藥簡便者(如給藥前不必絕食，免給瀉劑，投藥次數少，猪喜歡吃的藥品)。
- ③ 採用不發生副作用的藥品(如投藥後不嘔吐，食慾正常，無其他副作用者)。
- ④ 在前述條件下，盡量選用藥價便宜者。

每一種驅蟲藥，各有不同之作用及效能，所以在驅蟲前必須請獸醫檢查糞便，確認寄生蟲種類後，遵照指示購藥驅蟲，以免浪費。

能活動，加強其他臟器機能，尤其可使體內寄生蟲難於寄生，並促進仔猪發育。


怎樣驅蟲？



，中期星三前收穫
，松拉馬射噴該應
，靈特地與靈特愛
。蟲害的下地治防



，期初的育生菜蔬
，時生砂害蟲有如
，精操魚射噴以可
。「BHC」或「DDT」



，示告出局審林農
，知當應農菜位各
，前天四種收菜蔬
。施可不樂農微一