



五峰種馬鈴薯 ！利有最培栽天秋

昌培陳

本省的马鈴薯大多集中在臺中縣施行水田裏作，所生產的马鈴薯除一部份外銷東南亞外，在省內自給至九月。「五峰」種馬鈴薯適宜秋天栽培，如於九月中旬栽植可在十一月下旬採收，以高價供應聖誕節及新年的市場。

去年年底，本刊曾經刊載過專文，向各位介紹一種在本省育成的馬鈴薯新品種「五峰」。由於農復會的協助，新竹區農業改良場已繁殖了五噸以上的「五峰」種薯，以供今年秋天栽植之用。

秋季栽培優點多

「五峰」種馬鈴薯既適春植又適秋植，但在秋季栽培，有如下幾個優點：

氣候條件最適 九十月的氣溫，適於馬鈴薯初期生育，可充份發揮「

五峰」種早生、豐產的優良特性。病害少 栽培馬鈴薯，最怕的是疫病。疫病病菌好濕潤，而十一月是乾燥時期，較之冬作、春作容易預防該病。

收量豐富·售價最高 秋季栽培，因上述兩種原因，收量既較豐富，並且因採收期適為本省馬鈴薯缺少期，可以高價供應聖誕節及新年的市場。過去在苗栗鎮每十公畝平均收量為二千六百公斤。

選擇優良的種薯

栽培馬鈴薯，最重要的是種薯的選擇。優良種薯應具備：①品種純正，②不含病原、病菌，③栽培時開始伸出幼芽等三條件。每十公畝需要六十公斤種薯。栽植前二日切片，使切斷面形成新皮，以減少種薯腐敗。一片約二十公分（八錢重）。在上午十點以前或下午三點以後栽植，對幼芽生長有利。

在肥沃地上栽培

耕地肥沃，為馬鈴薯栽培成功的第二要訣。馬鈴薯適於砂質壤土，排水良好的土地栽培，不要與茄科作物連作。犁耕前每十公畝地先撒佈腐熟堆肥一千二百公斤，製成畦寬三臺尺，溝寬一臺尺的南北向雙行畦，或二五臺尺的單行畦。

三臺尺寬畦上作行距一·五臺尺的二行栽植，溝深三臺寸，株間八臺寸。

多施化肥與水肥

馬鈴薯的肥料吸收量，較一般雜

作物為大。每十公畝地應以硫酸銨十五公斤，過磷酸鈣三十公斤，氯化鉀十公斤作為基肥，種薯放好後，撒佈在種薯與種薯之間。幼芽伸出地面時，施水肥一次。株高三臺寸時，每株留一莖，並施十公斤硫酸銨及水肥以促進生長。

注意中耕除草

栽植至幼芽伸出約需二星期，此間容易發生雜草，所以應在伸出地表時立即施行第一次中耕，鋤鬆土地，使空氣、水分流通，肥料分解，以促進根群生長。

株高六臺寸時作第二次中耕。馬鈴薯根較一般蔬菜淺，集中在地下五臺寸土中，第二次中耕宜淺，以免傷根害群。

第二次中耕完畢後，在植株頂端出現小花蕾前（秋作不會開花），將輕鬆土壤培在植株周圍。厚度以二臺寸為標準。

噴藥預防病害

為了預防疫病，在株高六、七臺寸時，噴射三百倍水銀波爾多液或大生七十八液。先噴葉背，再噴葉面，使被上一層藥膜，以防病菌侵入。每隔二星期噴射一次。

偽瓢蟲好食馬鈴薯葉，食痕呈網目狀，應噴射一千倍馬拉松殺除。

八十日即可採收

五峰種在秋季栽培，栽植後第八十日即可採收，不需等到莖葉變黃完全成熟。擇晴天早晨掘出，在田間曬乾表皮後，分級搬運貯藏。

註：新竹區農業改良場採得的種薯，將全部委託新竹市中央路九十六號華隆行代銷，需要種薯的農友，請逕向該行洽購。

消炎化膿症

所有炎症一日服一次整天有效
免除一日數服的麻煩



比較其他消炎片
價廉效大

△購買時請認明金黃錫紙上
印有英文字樣包裝（藥房均售）

全無苦味 小兒易服
小兒請用 オムニボン 糖漿（シロップ）

最新速效持久性消炎片

