

不要亂吃成藥


振

毅

患病時，不要自作聰明，亂投藥石，應該接受醫生的診斷，處方治療，不要將醫藥當作兒戲，錯過了正當的醫治時期，甚至白白犧牲了生命。

最近，隣居汪家的孩子發燒，爲了減輕家庭負擔起見，汪先生便在藥房裏隨便買了一包傷風藥來吃。起初，病況似乎好轉一些，可是第二天，病情忽然急起變化，孩子的溫度更高，痙攣，而且昏迷了過去，急得汪太太

手足無措，還是汪先生比較鎮定，趕忙把孩子送到醫院醫治，經過醫生診斷後，才知是由喉頭發炎而起。如果早一、二天醫治，很快就會好，可是因爲現在已經轉成了肺炎，不但孩多吃苦，而且又要多化許多錢。



不久以前，我的皮膚上，突然起了一個小紅斑，先以爲是普通的濕疹，就未加理會，更沒想到該請醫生診治。後來癢得很厲害，夜晚睡不成眠，並且紅斑漸漸擴大。

第二天：後面李先生看到了，並知道我的痛苦，便從牆壁上，拿下一盒藥膏給我，是抹取一盒藥膏給我，是抹


皮膚病最好的藥，於是我就立刻塗上患部，誰知結果不但未好，反而痛癢加劇，並且腫脹起來。

在是危險的事。

病人胡亂服用藥品，危險性之大，是許多病人意料所不及的，尤其要注意的，不但是注射用的藥品，病人自作聰明地去做，固然非常危險，就是丸藥和藥水，如果不遵守醫生的指示，就隨意服用，有時也會闖大禍。許多人都以爲注射是比較危險，丸藥粉藥就不大要緊，這是極淺薄可怕的見解，有時會引起意外，這是不可忽略的。

大凡有效的藥，往往有很厲害的副作用，尤其是幼兒和身體太弱的病人，對於一般的藥物，也容易引起過敏性反應，引起更嚴重的疾病，或者拖延疾病痊癒的時間，病人如果接受醫生的指導，自作聰明，亂投藥石，不識藥性，隨便地亂服，就可以引起嚴重的反應。

此外如最新的抗生素藥類，因爲它的藥效大，因此有些人，無論什麼大小的病，都不經過醫生的診斷，自己隨便買一種「特效藥」來吃。但不知有許多抗生素藥物，會發生嚴重的藥物反應，甚至死亡。因此對於抗生素藥物的施用，更是不可以隨便。



衣縫的各種縫法

芝敏

將衣服的各片連合起來時，最簡單的縫法，就是把衣服的正反面相對，在反面縫一次，再把縫處分開燙平就行了。但有時遇到質地疏鬆一些的，縫處毛邊很容易散開，跟着衣縫也就脫開了，所以要加注意，使毛邊不致脫開才行。下面告訴你一些衣縫縫製的方法。

①最簡單的一種（如前述）。
②縫好後用鋸齒剪將毛邊剪成鋸齒狀，多用於質地緊密而不易鬆散的布料上。
③不太容易鬆散的料子，可在縫好後熨開，再用線繞毛邊縫半公分。
④初秋，做件沒有裡子的短外套，如用質地較薄的但易鬆散的料子，那末在直縫熨開後，宜再將毛邊折入車縫一次。這樣可使衣服的内部美觀整齊。
⑤布質厚而容易鬆散的料子，用來做外套大衣，也不加裡的時候，縫好熨開後，兩邊可

用斜布條滾邊。
⑥先在正面縫一次，翻過來，正在反面縫一次。這種縫法多用於薄料。但不能用於彎曲部份。
⑦縫後將一邊剪去後半公分，然後將未剪去的一邊，向剪去的一邊熨平，再用交叉針縫。
⑧車縫一次，然後將一邊剪去半公分，將未剪邊的一邊折入半公分，用手或車縫一次。

