



來信請多
利用明信片，
信中免除客氣
話，寫明姓名
住址，信的正面註明「農間」。

柑桔瘰癧病爲害

可用福爾丹防治



柑桔瘰癧病，不知何病？它不會結果，偶生一二個果，果皮也是和菓一樣，不會長大。二、用何種藥來治療及防治？三、進到樹幹中的蟲，常常捉不到，我用馬拉松浸的棉塞入穴內，不知對於柑樹會否有不利嗎？

【答】：一、寄來標本乃柑桔瘰癧病爲害，應於花苞將開放時，使用五〇%「福爾丹」可濕性粉劑四〇〇倍稀釋液撒佈一次，結小果時再撒佈第二次，或隔三星期再撒佈第三次。二、浸馬拉松之棉球塞入洞穴，應不會引起焚害。（劉康鑑）

防治甘藷害蟲

可用阿特靈粉

【問】：在甘藷床中所發現的幼蟲，（附標本）專在距地面部變態部嚙害，被害莖都裂開，外面有蟲糞，幼蟲就潛伏在莖中爲害，請問如何防治？另外一種甲蟲的成蟲（附標本）專在葉部食害，請問該種蟲又係何種害蟲及應如何防治？（臺南縣府水德）

【答】：所附標本在距地面部變態部嚙害者爲金龜子幼蟲，俗稱地蚤，蟬蟻。一種爲金花蟲成蟲，專吃甘藷葉片，幼蟲食甘藷塊根外皮，此兩種害蟲，均可用四〇%阿特靈粉，於甘藷插植前，先行土壤處

理依每公頃使用十二磅半之比例，用水或土均勻和入土中，可免以後爲害。（陶家駒）

果樹紫膠介殼蟲爲害

可用夏油乳劑等防治

【問】：一、荔枝近來患了一種病，而患了便枯枝且死，不知此病病是什麼？（請看附上之標本）。二、這種病病是否會傳染？有何藥品治療？三、患了此病者，是否將枝折掉或整株除掉不要？四、管理期間，噴射藥品時，是什麼時間較爲恰當？隔多少時間噴射一次？五、前（一）（二）（三）項裏說到此病菌，那麼這些病菌的發生，是否與地勢空氣通風有關？或者這些病菌是跟甜柑帶來的？（屏東縣陳登祥）

【答】：一、所附標本爲紫膠介殼蟲。二、會傳染，可用松脂合劑，夏油乳劑防治，但須觀察其卵子孵化期，把掘時期防治之。三、有蟲時，只要把掘撒布時期，可以徹底防治之，不須將枝折掉或砍去。四、請就地研究，觀察之。五、此蟲是由泰國引進，原來做洋乾漆，因爲近來無人利用，任其蔓延，所以現在成爲害蟲，在不通風處，爲害較多，都由風、鳥、飛蟲，苗木等傳播而來，現在全省都有，尚未成大災害，但亦不可忽視之。（陶家駒）

大肥噢

料飼助補質礦命他維合綜素生抗

售均會農店料飼
用請猪大養



所葯製源益

號二七二段三路福斯羅市北台

永代農葯
TRADE MARK



信用最好
MARK

省政府檢驗合格農葯

核發登記證007 025 026號



巴拉松 乳劑 47%
P-M 乳劑 50%
馬拉松 乳劑 50%
安特靈 乳劑 19.5%
555EM 乳劑
草子·利美農

請認明政府檢驗合格永尤的好農葯！

永尤的農葯牌子亮，信用好，價格廉！

進口優良農葯「好殺松50」鋁瓶裝

永代農化五廠

日中市成功路276號 電話4661號