

柄紫紅色，葉身全緣或有波狀缺裂，葉質近似甘藍，葉肉厚。種子粒大，棕黑色，一千粒重多在三、四公分左右，須種子直播，不宜育苗移植。

面商，介紹購得此項種子四磅，栽於彰化縣溪湖鎮，收量極豐，加工後的醬菜，暢銷臺北市場，但其味略遜於雲南大頭菜，為美中不足之點。
註：蕪菁學名 Brassica rapa, L. 英名 Turnip, 瑞典蕪菁學名 Brassica napobrassica, DC. 英名 Rutabaga (比較通用) 或 Swedish Turnip.

熱天 怎樣 避免 乳牛 減產

—— 輝 增 陸 ——

時過中秋，天氣已逐漸轉涼，可是中午時分的氣溫依然很高，尤以中南部地區為然。乳牛極忌高溫，本文雖載於今年夏季出版的美國畜牧雜誌，但仍值得做為此時期的本省酪農的參考。

在炎熱的季節，乳牛的產量，往往會降低二成以上；因在華氏五十至六十度是乳牛產乳與飼料利用最適宜的溫度，當氣溫昇至八十度時，乳牛的體溫昇高，食慾降低，產乳量也隨之減少。

溫度高再加上濕度高，能使乳產量減得更多。在下面有六點方法，可以在熱天維持乳產量：


- ① 供給最優良的牧草。
- ② 儘量減少飼料中的纖維成分含量。
- ③ 供給足夠的蔭蔽處所。
- ④ 牛棚中的空氣，應保持流通。
- ⑤ 使乳牛隨時能得到新鮮並且清潔的飲水。
- ⑥ 驅除蠅類。

A. I. Digest, Vol. IX (No. 8)

農 業 小 識

△過去新竹地區小麥栽培面積甚少，其主要原因之一，為一般農友認為小麥吸肥力強，將影響後作水稻產量。(郭·蘇)
△新竹區農業改良場，在民國四十六年，對於小麥影響地力的問題，提出了如下的二項解決辦法：①不減少小麥種植面積而混作紫雲英。②小麥種植面積減少三分之一，在減少的面積上種植紫雲英。(郭·蘇)

△不減少小麥種植面積而混作紫雲英時，小麥生育與紫雲英收量有相反的關係。減少小麥種植面積以栽培紫雲英時，也有類似的影響，可是沒有前法顯著。(郭·蘇)



九種複合微量元素

メタリック

美多收

註冊商標

中臺字11649號

成份：鐵、銅、鋁、鎳、錳、鋅、鎂、鉬、硼
多種複合葉面撒布劑
(使用時需加展着劑)

◎人畜無害◎

農友的一大福音 科學造福人類的新時代來臨了！

●增產大革命●增收的原動力●

請選用 美多收 液劑

能使農作物提早收穫，改善品質，增加產量，增強抵抗病蟲害侵入，保證效果確實。
欲使農作物根部強健，確保着花着果等，請將「美多收」混合「愛多收」使用效果加倍！！
本劑與肥料相同是愛多收農家必備之藥品。

製造：日本旭化學工業株式會社榮譽出品
臺灣總代理：臺實貿易股份有限公司

臺北市太原路四四號 電話：45437 41119

總 經 銷：榮 興 行

臺北市西寧南路15號 電話：32169 32396



純●日●本●原●裝●
現●貨●供●應●

經 銷 處

- ① 惠東 農興隆 豐美 種農 業資 社農 會
 - ② 東莞 順永 豐
 - ③ 華美 高源
 - ④ 順永 豐
 - ⑤ 順永 豐
 - ⑥ 順永 豐
 - ⑦ 順永 豐
 - ⑧ 順永 豐
 - ⑨ 順永 豐
- 宜關縣羅東鎮中正路
 - 新竹縣新埔鎮中正路二巷12號
 - 新竹市公園路64號
 - 臺中縣霧峰鄉中正路327號
 - 彰化縣員林鎮中街61號二樓
 - 彰化縣員林鎮中正路93號
 - 彰化縣永靖鄉永西村63號
 - 雲林縣斗南鎮新興街30號
 - 嘉義市中山路192號
 - 建南農藥行——嘉義市中山路452號
 - 年豐農藥社——嘉義縣竹鄉大桂村199號
 - 豐益農行——臺南縣新營鎮中山路192號
 - 臺南縣農會——臺南市中正路51號
 - 慶雲西藥行——高雄縣鳳山鎮第一市場內
 - 屏東市農會——屏東市公勇路95號
 - 慶豐農友行——屏東縣潮州鎮中山路54號

及各地蔗農服務社、農會均有經售