



柑桔天牛爲害

用地特靈防治

【問】：一、我的柑桔樹發生一種病，這病發生於一株柑桔，所發生只有一半，其他一半不會發生，不知是何種病蟲害？如何防治？

二、柑桔樹頭及樹幹好像葉一樣，就枯黃死了。這樣是什麼病蟲害？（臺中縣劉己春）

【答】：一、紅蜘蛛爲害，可於採果後及五月間，各撒佈九五%「高級夏油」七二倍液或「益加津」四百倍或「滅地悉死脫」二百五十倍「克爾萊」一千倍或「鐵地旺」五百倍或「開路生」五百倍一次。

二、天牛爲害，可用五十%「地特靈」可濕性粉劑一百倍稀釋液或一八·八%「地特靈」乳劑三五至四〇倍稀釋液，於四至五月間，噴射於樹幹離地面六英尺以下之四周，防治枯天牛及星天牛。（劉康鑑）

防治柑桔潛葉蛾

可撒佈益加津等

【問】：我於去年種植二年生柑桔一百五十株，至今經過發育生長良好，但於上月中旬突然發生病蟲害，故附上病蟲害標本，這是什麼病名？用什麼藥防治比較有效？（彰化縣徐鵬鵬）

【答】：防治潛葉蛾可於新芽葉發生時，每七天撒佈「益加津」四百倍，或「滅地悉死脫」二百五十倍或五E「馬拉松」八百倍

治之，採果前一個月停止用藥。（劉康鑑）

防治棉紅蜘蛛

可用安特靈等

【問】：一、本地在棉花生育初，中期多陣雨，有時每日都有陣雨，殺蟲劑中加用展劑，能不能增加延毒力，是否合於經濟？

二、以克爾萊防治棉紅蜘蛛時，能不能同時殺死其他害蟲？（臺南縣朱慶雲）

【答】：一、棉花生育期，殺蟲劑中加用展劑，能增加延毒力。展劑用很少亦可收較大的效果。且其價格不太貴，可說經濟。

二、以克爾萊防治棉紅蜘蛛，同時可殺死棉蚜、棉蚜蟲等，在葉背面的害蟲，但這兩種害蟲可使用其他較廉價的殺蟲劑，如安特靈、巴拉松等，簡單防治。克爾萊對目前棉主要害蟲，金鋼鑽及大紅鈴蟲，防治效果不佳。因此，如棉紅蜘蛛發生時，應以安特靈或DDT爲主（防治金鋼鑽或大紅鈴蟲），以克爾萊爲副，期能得到圓滿的棉蟲綜合防治效果。（蔡雲鵬）

杜鵑花銹病爲害

可噴射大生防治

【問】：一、我家所栽的杜鵑花莢子背面常有銹狀的小點，是否係蟲卵，抑病害？請問用何法防治？二、杜鵑花生長時，有時部份莢子變黃，顯得養份不足不均的模樣，這是什麼道理？（正言書報雜誌）

【答】：寄來的標本三葉片，係被銹病所爲害，如噴射大生七十八或一二二（四百倍）水溶液，在初發期開始每隔七至十天噴一次，繼續三至四次，又葉背面須充分均一噴射。

請採用效果確實的植物生育促進劑

價目表函索即寄

● 種子行西藥房均有出售

● 全省各地農會農藥行大量供應優良種子農藥

2571

現貨供應

● 勝過任何種 植物促進劑

● 保證效力

● 提高產量

● 提早收穫

● 改善品質

彰化縣溪湖鎮員鹿路66號二 Tel. 122

員林鎮中正路88號

郵局對面中第20760號

高雄市中正路180號

郵政劃撥高字第40714號