

二、寄來的標本二葉片，因不明顯無法鑑定，一般杜鵑花須在排水良好地才能生長好，故須設置排水溝使其不可過濕。(簡錦忠)

**稻葉尾的捲葉蟲 用BHC粉防治**

【問】：一、我田中因有缺株現象，要得大秧苗(時間久的)補植，發現秧苗葉裏有褐色斑點。附上樣本請問此是蟲害或病害？  
二、我的田現有一葉尾蟲很多，我噴以安特靈(日本製)，但效果極微，大都沒有死，損害有加無減。不知應用何藥防治？  
三、我的田是鹽分地，播種已有十七天，都繼續保持有一寸水，未曾中斷，會不會影響(減少)分蘖呢？(佳里鎮陳裕元)

【答】：一、照樣本看，不是蟲害，檢驗結果，只有「胡麻葉枯病菌」而已。大概因秧田地力不宜而營養關係，致使該病發生損害。  
二、稻葉尾的捲葉蟲用安特靈，不如用BHC粉三分的，每分地六毫斤撒佈於稻株效果即大。或是用「巴拉松」亦好。該蟲夜間就出來為害，所以下午噴藥較好。  
三、稻田因鹽分地帶時常灌水是沒有辦法的。不過水深一英寸尚為適當，不致影響分蘖。鹽水田未得晒田故吸收分較劣，即因土壤裡空氣不能進入，自然地氣氣缺少發育就不宜，以致收效未能達到理想。  
磷肥儘速於插秧三十天以內施下較妥。(余慶東)




**蕭草分大甲蘭三角蘭 通常是用分株法繁殖**

【問】：請問蕭草如何種植：(一)繁殖方法，(二)栽培土宜，(三)栽培地區及氣候，(四)栽培之方法，(五)自栽培至收穫期為若干時日？(岡山王景炎)

【答】：蕭草分大甲蘭與三角蘭二種，通常用分株法繁殖。性喜高溫多日照且富潮濕之氣候。適宜之土質與水

稻同，植土乃至地質壤土之旱田而能被灌溉水除餘浸透者最佳。臺灣中部大安溪下游之大甲及苑裡等地成為特產。二至三月間移植，移植前仿照水稻田整地法整地。移植時用秧鏟苗，掘落泥土，切去梢頭部，留十五公分長，以株距一五至三〇公分，每株五至六莖植於本田。移植後二至三週間灌水與排水宜勤，日間需要排水。移植後一五—二〇天行第一次除草，三十至四十天行第二次除草。六十至七十天株高達一五〇公分以上時，行一、二次之切梢。切去一三〇公分以上之梢頭。六月間(移植後一百天，莖色稍呈黃綠色時)第一次採收，九月(第一期採收後一百天左右)行第二期採收，利用晴天用鐮刀自接近地面之處割取乾燥出售。(陸之琳)

**龍眼的移植或定植期 適期為十二月至二月**



【問】：龍眼的栽培期及其栽培方法，盼能簡略告知。(嘉義市丁發光)

【答】：龍眼的移植或定植適期為十二月。可選二—三年生之實生苗或嫁接苗定植，株距十公尺。對土壤之選擇不嚴，凡土層深厚，排水良好之壤質乃至砂質壤土均適宜。植後管理方便，實生苗七至十年後，嫁接苗四至五年後即開始結果。為防止隔年結果，花序萌發過多之年，應行適度修剪，以促進新枝葉及早發生。(陸之琳)

**柑桔發生裂果現象 應注意肥培管理**

【問】：現在柑實已有茶杯形大。很多自然裂開。未知如何原因，如何處理？(屏東縣鎮阿妹)

【答】：這是樹的營養狀況不良，樹葉太少，而過氣候乾燥失調時即發生此現象。應注意肥培管理，在乾燥期中樹下行厚覆蓋，如能在乾季中常時灌溉，更佳。有時，根部因受強風搖動樹身而受傷，或因雨季積水不

**武田老牌 最新農藥**

**武田滅爾**  
武田メル

水稻稻各及  
熱病病蔬  
劑乳劑種果樹菜  
細菌病最新  
特效藥

**武田安特靈**  
武田エンドリン

乳劑 19.5%  
水稻，旱地作  
物及果樹害  
蟲之防治

**武田徽素**  
武田マイシン

水稻白葉枯病，柑  
桔潰瘍病，白菜軟  
腐病，馬鈴薯蕃茄  
疫病特效藥

**武田飛佈達**  
武田ヘプタ

粉劑  
適於缺區  
土壞害(甘  
毒象蟲金  
針蟲、蝸  
切根、黃  
瓜等)防  
之

日本武田藥品工業株式會社

臺北出張所

臺北市中山北路二段二二號之二 電話 49344 49345 49346

輸入元

立大貿易有限公司

臺北市太原路五五號三樓 電話：48170 41108