

療。但是如能早期發現，並診斷確實，治療效
果良好。

應用「盤尼西林」治療很有效；為使藥効
迅速持久，宜用水質「盤尼西林」加配長効「配
尼西林」注射。盤尼西林的用量，每公斤體重

應用一萬單位，最低限度也需四千單位以上。
臺糖養豬場在未發現本病以前，每有母猪
突然精神不振，食慾廢絕，體溫驟昇至攝氏四
十一度以上時，如為白色豬則有全身皮膚發紫，
都立刻注射大量「盤尼西林」，而迅速痊癒。



慎防初生仔豬發病！

季培元

初生仔豬發現有病，必需迅速設法治療，否則將影響日後生
育，減低養豬的收益。

初生仔豬體力孱弱，易受細菌侵襲而發病；又如鎖肛、胎便停滯，也
是初生仔豬常見的毛病。請農友們注意預防或治療。

下痢

患畜排泄灰白色糜狀水樣惡臭糞便，有泡沫，有時混雜血
液，不想飲乳，腹部卷縮，肛門周圍脫毛，營養漸次衰退，如

不早治，很危險。

療法：如因飲食不良乳汁而引起者，應先使母畜乳房清潔，調整給乳溫度及次數，保持母
草乾燥，嚴防賊風吹襲，畜舍保暖。藥物方面先給瀉藥，再給止瀉劑，使下痢停止。

臍炎

臍帶落後，殘餘部感染病菌，發炎濕
潤，呈黑褐色，發惡臭，分泌粘稠膿樣液
，可引發全身症狀，元氣不振，體溫上升，不想飲乳
，常橫臥不安。

療法：在臍部周圍剪毛消毒，以稀碘酊、紅汞水
塗佈。有全身症狀時，應請獸醫施藥治療。

鎖肛

胎兒生出肛門閉鎖，患畜時作排糞狀
門有膜狀閉鎖，宿糞膨大隆起。

療法：無適當良法，試在膨大隆起部分，行十字
形截開，除去宿糞，或者有效。

胎便停滯

患畜不安，背脊彎曲，時作排
便狀，有疝痛症狀，不想飲乳，呼
吸變快，很痛苦。

療法：以手指伸入患畜肛門，除去糞便。或用溫
水灌腸，或給瀉藥使胎便排出亦可。以後需時常注意
排便暢通。

農業小知識

△鼈的種類有數種，在我
們臺灣產生者，腹甲（肚底）
部份多少有斑點，但因帶有顯
著保護色之故，可能有所變化
。（郭）

△優良的鼈種，腹甲（肚
底）腳根附近應呈黃色；赤色
者為中等，青白色者為下等。
背甲（殼）青綠色者為優等；
茶褐色者為中等；暗黑色者為下等
。（郭）

△種鼈可在各地選購。臺中市
西區向上路一段二二六號林萬壽，
及彰化縣鹿港鎮中山路二四八號樹
榮，均有出售。種鼈每隻一百五
十至一百八十元，幼鼈每隻十五元
上下。（郭）



不可不
遺若農
落無好
層兼人
透兼弟
(居隣) 弟具
，已害，
，注意



後用
空日
收即久
，起免深
，已自害
，速田去
，速田去



空
，去踏
(擲亂) 硬使亂
，去踏脚(碎打)破有
，繫繫趕血流有若
。死枉冤毒染免即