

來信請多  
利用明信片，  
信中免除客氣  
話，寫明姓名  
住址，信的正  
面註明農問。

棉田發現大紅鈴蟲等

應噴射 DDT 安特靈



【問】：一、我所種棉田並無連作、棉花發育初期開始就七至十三日噴藥一次，每次噴藥時每桶採用 DDT 乳劑二五%混合安特靈各三十 C.C. 並用過棉花蟲藥每桶四〇〇 C.C. 但是自始花有棉鈴時至今害蟲(紅鈴蟲)等仍然潛伏在棉鈴內活著無恙，並使棉鈴腐爛以上所列防治期間及藥量是否適合？二、去年木鄉一般棉農並用這樣的防治仍然受害，較地近年來之地質及氣候是否仍適合栽種棉花？三、想試用益加津是否有效？四、其他是否有特效藥？(雲林縣林萬全)

【答】：一、棉田雖無連作，但棉蟲可從近鄰飛來產卵傳播加害。貴函所述「噴藥時每桶一，不知「每桶」水容量為多少公升？故無法答覆。濃度是否適當，現暫以每桶一〇公升的水容量計算，則應加入二五% DDT 乳劑五二 C.C. 及一九五%安特靈二〇〇 C.C. 二、開始發現有大紅鈴蟲或棉鈴蟲時，即噴射上述藥品必能收治蟲之效。  
三、益加津為專門防治蚜蟲、紅蜘蛛、浮塵子等之農藥，不是棉花主要防治藥劑，且價格昂貴，不可不使用。  
四、棉花特效藥就是 DDT、和安特靈(專門防治大紅鈴蟲、金鋼鑽、棉鈴蟲等)。詳細防治方法請參照「五十年度植物保護推

廣方法」第四〇頁，切不可「病急亂投藥」，釀成人力、財力之不必要損失。(杜金池)

防治柑桔潰瘍病  
可噴射波爾多液



【問】：①我種的柑已有了一年了。到現在藥上不知發生了什麼斑點，(附寄標本)不知何病？但我曾噴射馬拉松，仍未見效，是用何種藥品才可防治呢？是不是可以噴射施藥養元的藥劑？(屏東縣劉文風)

【答】：一、於六、七、八、九月間噴射四斗石灰波爾多液各一次或用水銀波爾多亦可。  
二、尤應於颱風期注意噴射藥劑。  
三、應加強風籬之設立。(劉康鑑)

防治木耳原木的黴菌  
可用石灰硫黃合劑等

【問】：我種木耳之原木、發生黑色及黃色黴菌，(尤以黑色黴菌蔓延多而迅速)妨害木耳生長，請問用何藥可資防治？(茲將黑、黃二色黴菌標本附上)(高雄市區煜南)

【答】：發生黑色或黃色黴菌原木可放在石灰硫黃合劑、硫酸銅、炭酸鈉等水溶液中浸漬一分鐘，可殺死木病原菌。蛀蟲可用五〇%「地特靈」可濕性粉劑一〇〇倍稀釋液噴撒於原木。(胡朝仁)

好消息!!  
雞白痢特效新葯出現了!!


英商卜內門公司榮譽出品



防治鷄白痢

鷄白痢及其他頑疾特效新葯

用法  
治療用配：合飼料  
預附用：配合飼料  
供飼銀 四四八倍



總代理：英商卜內門有限公司  
臺北市中正路一八〇〇號 電話：二六六九〇  
經銷處：永生西藥行  
臺北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六

永光農葯 TRADE MARK 信用最好

省政府檢驗合格農葯  
核發登記證 007 025 026 號



永光農化五廠  
臺中市成功路276號 電話4661號