


水淹的田地應即排水 葉上鹽份以清水沖洗



【問】：一水稻因被颶風損害後要如何管理和如何施肥，要用何種肥料？二、排水或澆水如何？三、稻葉部全部損害，要不要施藥？如要施藥時要用何藥劑？（礁溪李茂生）

①水淹的田地應即排水；如葉上有鹽份，應即以清水沖洗；至生育恢復時再照普通辦法澆水；將倒伏之稻株扶起，放直後每五、六株用繩綁在一起，防止再倒下；必要時，以一至二%尿素水溶液噴葉上，如未抽穗時，稍施氮肥（硫酸銨與鉀肥）。②先排水後澆清水（見前）。注意晒田，以防倒伏。③預防發紋枯病，噴「多穗」或「阿蘇新」。（張德慈）

油菜新品種新竹特一號 與臺中特一號栽培法同



【問】：我去年向農會購買油菜種子臺中特一號，經過收量不錯，但是過一期再向農會申請購買種子時只有新竹特一號，不知種類與管理方面有何處差別否？（彰化縣吳國勝）

【答】：油菜新品種新竹特一號與臺中特一號在栽培方法方面，完全相同。前者生育日數略短，故較適於苗栗縣以北第二期水收刈較遲之地區，但在臺中以兩地區栽培亦同樣適合，並非一定要在北部栽培。（陸之琳）

颶風後的柑桔株 應注意妥善處理



【問】：颶風後柑桔處理法如何？因為強烈颶風九、一二又襲中部地區，我栽培之柑桔約二、三年生育很好，但致被暴風雨侵襲，樹勢傾倒，根部突出

，有重嚴狀態，如何處理？恢復獨弱衰弱愈救方法如何？柑桔幹部及根部傷害部份須要使用藥品處置否？適合什麼藥劑否？（南投鎮吳昭興）

【答】：颶風後之柑桔株處理方法如左：
一、將受颶風傾倒株扶正、用以竹竿作支柱。
二、搬運乾燥土壤，覆蓋突出根部並緊踏之。
三、被害株儘力避免修剪，維持炭素同化作用。
二、待根群恢復正常生長後，施用速效性肥料，以謀短期間內樹勢之恢復。被害嚴重株，依根群之被害程度亦有根接之必要。
三、受傷株幹部可塗佈糊狀石灰硫黃，防止病原菌之侵入。（翁仁祿）

桃園龍潭附近地區 適宜栽培桃柿李等

【問】：龍潭可否種植「士林桃」、「紅柿」、「李」三種果樹？如可種植，請告知種植適期種植前之準備及施肥。（桃園程維新）

【答】：龍潭附近適宜「士林桃」、「紅柿」、「李」等之栽培。惟龍潭地，因風強，須有防風設施。桃柿李之種植適期，株距、種植前之準備及施肥等事項列表如下：
一、桃①種植適期：十二月至一月。②種植距離：三、六×三、六公尺，每公頃七五〇株。③施肥：土壤於肥沃時，如氮肥過多，易引起落果、減少風味，故應多施磷鉀肥。施肥之種類如大豆餅、過磷酸石灰、硫酸鉀、堆肥、牛尿等。④注意事項：桃之栽培上，排水問題最須考慮。於排水不良之地雖在二、三年間生長旺盛，但至三、四年生後，地上部自然衰弱枯死。
二、柿①種植適期：十二月至二月。②種植距離：四、〇×四、〇公尺每公頃六二五株。③肥料種類如大豆餅、過磷酸石灰、硫酸鉀、堆肥、牛尿等。④注意事項：須選擇排水良好之土地。⑤柿根稀少之故，定植時直根須留長。
三、李①種植適期：十二月至二月。②定植距離三、五×三、六公尺每公頃七五〇株。③肥料種類如大豆餅、過磷酸石灰、硫酸鉀、堆肥、牛尿等。④注意事項：李具有同一種間不受粉之性質，須混植異品種。（翁仁祿）

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

阿司卡利肯

（內藥登字第一四六四號）

適應症：豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症
公認：效力強大，殺蟲之力量百分之九十五以上，比任何種藥劑高。成蟲、蟲卵均死滅絕無副作用。
最安全：用法簡單，投藥前不須絕食，服後不須使用瀉藥洗腸。
最有效：價格最廉，豬一頭一元，成雞一雙僅五分。代價可獲得數百倍利益。

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

總代理：臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司
臺北市信義路二段一二〇號



信用最好 價格最廉的

富農秋冬季優良蔬菜種子

各種農藥、農具、果樹苗、花木苗

應有盡有！！

如蒙採用必定得到滿意的成果

◎品種貨品詳細解說、價格、請閱敝行五十年度「富農園藝吉報」內容豐富附有栽培摘要。附郵票二元函索即寄

富農種苗行

行址：高雄市中正路一八〇號
郵政劃撥：高字第四〇七一四號
電話：三一六一
苗圃：彰化縣水靖鄉中山路54號