

肥羅歐 *

輔助飼料

以後各期在本頁中均將提供飼養禽畜最新技術資料敬請按期參閱

畜牧常識

- 一、留作種用的母豬一定要有十二個發育健全的乳頭。
- 二、留作配種用的小母豬在出生後四到五個月，或體重達到五十公斤時，應與肥豬分開飼養。
- 三、小母豬在出生後八個月，或體重滿九十公斤時就可配種。
- 四、母豬配種前必須用藥驅除寄生蟲，並應繼續注意環境衛生，以免在驅蟲後又發生寄生蟲病。
- 五、豬群在配種時，應在開始配種前七天到十天增加飼量，直到全部配種完畢後再將飼量減少。
- 六、無論是人工授精或自然交配，最好都能連續配種兩次，以增加受孕的機會，小母豬第一次配種應在發情的第一天，普通母豬應在發情的第二天，第二次配種都應在第一次之後二十四小時舉行。
- 七、假如受到條件的限制，不能連續配種兩次，則都應在發情的第二天施行人工受精或自然交配。
- 八、採用早期斷乳法增加豬隻繁殖量時應注意以下各點：
 - ① 仔豬在出生後二週斷乳者，其母豬應在斷乳後第二次發情時方可配種。
 - ② 仔豬在出生後三週斷乳者，其母豬在斷乳後第一次發情時即可配種。
 - ③ 爲了使早期斷乳的仔豬發育留好，應在代乳飼料（即教槽飼料）中加入歐羅肥。
- 九、母豬在懷孕期中應分欄飼養，餵用歐羅肥及平衡飼料並使其充分運動，以保持健康。
- 十、母豬在懷孕期中應驅除豬蟲及疥癬類外寄生蟲。

肥羅歐 *

* 註冊商標



六大功效： 促進生長 預防疾病 增加生產
節省飼料 縮短時間 增進收益

台灣氣陽股份有限公司 出品

臺北市南京東路一段十九號 電話：48608

總經銷：惠豐股份有限公司 臺北市長安東路一段八號之三 電話

分銷處：
屏東縣
高雄縣
臺南縣 嘉義縣
雲林縣
彰化縣
臺中縣、南投縣、苗栗縣
花蓮縣、臺東縣
桃園縣
臺北、新竹、宜蘭

惠農行
義順隆
裕農行
許宗輝
許惠臺
惠豐公司
惠豐公司
惠豐公司
惠豐公司
惠豐公司

屏東市中山路11號之2
高雄縣岡山鎮平和路151號
臺南市建國路216號
彰化縣溪湖鎮彰水路72-7號
臺中市興民街25號
花蓮市中山路322號
桃園鎮民族路57號
臺北市長安東路一段八號之三