

栽培四川榨菜的幾個問題

——年伯李——

「四川榨菜」是在本省推廣不久的一種加工用菜種，利潤極豐厚，可是由於產、製、銷的不相配合，很快地已經和其他幾種新興作物一樣，遭受了「不景氣」的厄運。今年的四川榨菜播種期又快到了，為了避免損失，請農友們在栽培之前，先注意本文所述的幾點。

尺，為配合苗栗縣農會榨菜加工事業，曾苦心經營榨菜留種。過去二年所留得的種子，均送交苗栗縣農會配售各地農戶栽培。今年所留的種子，較往年略多。

除西實外，新竹改良場五峰分場，海拔一千公尺，亦有種子生產，如需要者，可向該場洽購。

播種期萬不可太早

榨菜是一種短日照蔬菜，性喜冷涼氣候，生育才能優良，莖部發育，始可充分膨大。如在十月二十日以前播種，不論南北各地，不待莖部膨大，迅即抽苔開花。

為配合濁水溪以北二期水稻田的裡作，中部立冬播種，北部立冬前五日播種，為最理想。播種育苗後二十五天移植，立春前後收穫，根據往年氣候記錄，不會抽苔。

如能利用高冷地帶秋季十月上旬早植，可獲豐收，保證當年不會抽苔開花。

多利用有機質肥料

有機質肥料，如腐熟堆肥和廐肥，菜籽餅和芝麻餅，均為栽培榨菜的優良肥料。在生育初期，能儘量利用人糞尿、家畜糞尿，也有利於榨菜生育，並可促進莖部特別膨大。

施用法，堆肥和廐肥或菜籽餅和芝麻餅，可先混合作基肥施於植穴下方。每株用量五十至八十公分，而後覆土，菜苗定植於其上。

追肥可用人糞尿或尿素，視生育情況，酌量配合施用。

在西實農場據一位四川籍場員說，在其家鄉栽培榨菜，用堆肥作為基肥時，每株榨菜莖部膨大至二、三英寸者



頭菜榨的厚肥熟成

△預防豬肺蟲，最重要的是防止豬隻攝食蚯蚓 (Zizy)。感染後，宜用 Metastrom 驅除；每公升體重注射一立方公分 (C.C.)，連用兩天。(李)

△荔枝可以和龍眼一樣帶殼脫水後出售，但銷路不如龍眼。(王)

，為很常見的事。

產製銷要密切配合

根據今年苗栗縣農會的調查統計，省產榨菜內銷數量與年俱增。今年因加工榨菜售價不高，平均全省每日可銷售三千五百斤，以此數字推算，年可銷售七十二萬五千斤，需原料菜莖三百六十萬斤，方可製造上述數字成品。如以每公頃生產原料一萬五千斤計，約需栽培面積二百四十公頃，產銷才獲平衡。實際去年栽培面積超過三百公頃，却因製造不能密切配合，原料乏人收購，於是原料菜價慘落，造成極不景氣現象。

因此，今後栽培者必須事先與製造者取得聯絡，先約定原料生產價格及數量，才可避免有菜無人收購的現象。

原料成本不能太高

今年加工榨菜內銷數字相當可觀外，苗栗縣農會為拓展外銷，至目前為止，已運銷香港地區三萬五千斤，泰國地區八萬五千斤，合共十二萬斤。外銷市場打開，需要日增，新原料未出產前，目前省內存貨已感奇缺。

外銷出路雖好，但製造成本不能太高，如原料榨菜莖每斤不超過一元以上，內銷、外銷兩途均有利可圖。

因此，栽培者要注意，不求單價過高，但求單位面積產量增多，為今後擴展外銷唯一之要道。

農業小知識

△預防豬肺蟲，最重要的是防止豬隻攝食蚯蚓 (Zizy)。感染後，宜用 Metastrom 驅除；每公升體重注射一立方公分 (C.C.)，連用兩天。(李)

△荔枝可以和龍眼一樣帶殼脫水後出售，但銷路不如龍眼。(王)