



利用低窪地，栽培茭白筍！

· 呂文通 ·

茭白筍栽培簡單，生長強健，且其收穫期，正是夏季蔬菜缺乏的時期，請農友們多多利用低窪地栽培。

茭白筍又名茭鬱、烏鬱、菰等，其味清甜且脆嫩，為一般人所喜愛，是夏季蔬菜的上品。

本省的環境，很適宜茭白筍的生長，而且茭白筍的收穫期，正是夏季蔬菜缺乏的時期，如能利用低窪地廣為栽培，利益必定優厚。

池沼水道均可利用

茭白筍是水生的植物，需要濕潤水分充足的地方。對於土壤質地的選擇並不嚴格，壤土或粘土均能生長良好，但忌鹼性土。

生長的時期，為三至九月，本省氣溫平均為攝氏二十五度至三十一度，頗適宜於好溫暖的茭白筍生長，利用池沼或灌溉水道的空閒地栽培時，不但能得良好收穫，且可收保持水土的效果。但水的深度不宜太深，以四、五寸左右為佳。

選取地下部做種苗

栽培茭白筍，一般所用的，都是無性繁殖法。利用地下部份，包括地下莖、根及芽點三部份繁殖，分生力強，極易成活。

普通於三、四月間種植，早者於二月下旬開始亦可；太遲移植時，容易傷害根部，以致種植後生育不良，影響產量及品質。

施用基肥提高產量

茭白筍粗放栽培亦可生長良好，但為提高產量及品質起見，瘠瘦的土地，應於種植前施用腐熟堆肥每公頃二千

公斤左右做為基肥。施用前先將水排乾，將堆肥均勻撒於地面，用犁深耕，使堆肥埋入土中，耙平待植。通常在種植前一星期施用。

每穴種植二至三支

行距一公尺，株距七十五公分。種植深度以八至十二公分為佳；不宜太深，以免影響生育。每穴種植二至三支即可。

注意供給新鮮流水

種植後應隨時注意水的深度，維持三至四寸，不宜太乾或太深。

定植後半個月，可視生育情形，施用追肥；通常以硫酸銨三百公升（一公頃）分二次施用。施肥時，先排水至一寸深左右，施肥後即行中耕除草，一晝夜後再行灌水。

以後視生育情形，可再酌施人糞尿一、二次。

茭白筍忌滯水，因滯水易使茭白根發育受阻，肥份吸收力減退，生育亦行衰退，影響產量及品質，甚至於不能生產。因此，種植後應時常供給新鮮的水，至少亦須每星期換水一次。

此外，如雜草叢生時，應即拔除。池畔雜草亦須割去。

三、四個月後採收

三、四月種植者，於七月中旬開始採收。採收時，以莖基部肥大飽滿光滑者為適，不宜太早或太晚採收，太早者產量低，太晚者過於老化，品質變劣。

採收後，外部的苞葉不宜剝得太光，尤以運往遠方銷售者為然，否則易損外觀。

噴藥防治害蟲

茭白筍在臺灣尚未有嚴重病害發生，然而蟲害很多。因為茭白筍和水稻同為禾本科植物，所以，螟蟲、鐵甲蟲及蝗蟲等均能為害茭白筍。

螟蟲以PM八百至一千二百倍稀釋液噴射防治。鐵甲蟲及蝗蟲則以5%DDT粉或3%BHC粉撒佈防治。

此外，為防止翌年蟲害發生，應於十二月間將採收後所留的殘株或殘葉、梢等，和池畔的雜草刈除燒却，以免給害蟲作為越冬的好處所，且可促進翌年新芽的發生。

胃痛、胃酸過多

※胃那利散與眾不同，係由醫學界公認治胃痛最有效的ファイナリン為主成份製成之新藥包裝精美膠袋裝，隨身攜帶，一次一包，隨地可服用，服後五分鐘立即見效，是最理想的胃病專治藥

胃病新專門藥

ファイナリン
胃那利·散

日本山之內製藥株式會社 新出品

臺灣代理 泰源華行



每盒包裝15包
1盒價格30元
歡迎惠顧
劃撥臺北
246 壹即寄奉

