


分(CC)的蓖麻油整腸之後，再給與制痢劑(如水楊酸——サリチル酸一·八公分，單糖醇一·二公分，藥用酵素六公分的合劑，分三服一日服用；或碳酸鎂一公分，阿片末〇·三公分，大黃根末四公分，卡蜜爾列浸——カミルレ浸 患肺部，則應延請獸醫診治。

米 米 米

驅除豬蛔蟲， 不必要打針！

——季永基——



嘉義縣水上鄉趙武三農友來信說，應用口服藥劑驅除豬蛔蟲，常常使豬發生嘔吐、胃口不佳甚或忌食的現象，不知是否可用打針的方法來代替？其效果及方法又是如何？

這是筆者在農村裡常聽到的一個問題。因為過去本省採用的豬蛔蟲驅除藥，有效成份都是「氟化鈉」，而「氟化鈉」對個性敏感的豬，確能引起嘔吐或忌食的現象。為了避免此等副作用之發生，從今年初起，本省已全面採用「匹配拉淨」，以代替「氟化鈉」，各位如改購新藥使用，必定能夠獲得比過去更圓滿的效果。

要驅除消化道內的寄生蟲，以用口服法最為理想而有效。市面上出售的注射用蛔蟲驅除藥，都是用「山道年」製成的。這種藥劑的作用較為特殊，注射後雖可獲得相當好的效果，但因價格較高，毒性較大，最好不要使用。


同時要附帶向各位說明的一點，就是過去使用的「氟化鈉」只對蛔蟲有效，而「匹配拉淨」則除蛔蟲之外，對於其他寄生蟲，如豬鞭蟲、腸結節蟲等，也有相當好的驅除效力。又據最新的試驗結果，有一種低毒性農藥 Neguvon，比「匹配拉淨」具有更好的驅蟲效果。

農業小知識

△任何果樹皆可用雞糞為肥料，但宜用充分腐熟者或乾雞糞，在冬季休眠期施下。定植二年生的樹苗，視樹發育大小，每株施濕雞糞五至十公斤，或乾雞糞三至五公斤，開輪狀溝施下。此外仍需加施化學肥料。夏肥和秋肥宜施化學肥料。(蔡)

△臺灣薰茶用的花，有茉莉花、秀英花、球蘭花、玉蘭花、黃枝花、樹蘭花等。其中以茉莉花所薰製的花茶最香。(藏)

△農藥加用展着劑，其效用有下列三點：
①增加藥液的濕着力。
②改善藥液對植物的被覆力。
③如害蟲或菌絲分泌有抗水的蜡質，則展着劑可使藥液穿透此種蜡質而入於病菌或害蟲的體內。(蔡)



魚毒最速，電捕魚，單產應有，卑注友府，郵的意，旨，止。



人生必多財，生財之道，欲捕魚，作釣竿，魚網，來，該。



用電捕魚，大存心，財法，不該，大存心，財法，不該。