



親愛的柑農，果農及農友們，請特別注意，敝公司有下列「好速」現貨，小包裝供應：

好速「改良」除草劑

Ortho Improved weed-B-Gon

包裝：美國原裝四盎司小聽

· 除草簡便，收效宏大。

(請參考豐年十一卷五期一〇頁)

(請參考豐年十一卷十九期三十四頁)

好速「福爾丹」50%

可濕性粉劑

Ortho Phaltan 50%W. P.

包裝：壹磅裝，敝公司監督分裝

· 柑桔瘡痂病特效藥及防治。

· 其他多種植物病害。

(請參考豐年十一卷六期十五頁)

製造廠：California Chemical Co.
ORTHO Division

總代理

嘉農股份有限公司

臺北市長安東路二段14號

北區聯絡處

臺北市重慶北路三段七〇巷五十號

電話：四六五〇四



鳳梨園的施肥知識

致 謨

鳳梨施肥，如果施得不得法，就會燒傷植株，甚至使生育不齊，果實不甜。

鳳梨的施肥，在苗幼小時(植後半年)，施在植株附近土中；成長植株在雨季時也這樣施肥。雨水少的季節，鳳梨的施肥可以施在基部葉腋中，但不可施入植株心葉中，這樣會燒傷植株。施用硝酸銨鈣如果施得不得法，就會引起傷害。

鳳梨標準施肥法如左下表所示。

施 肥 期	硫酸銨(公斤)	過磷酸鈣(公斤)	硫酸鉀(公斤)
九月上中旬	一三·五九		
十一月上中旬	一〇·五六	七·五六	四·五三
三月上旬	一三·五九		
五月中下旬	一〇·五六	七·五六	四·五三

果實大小不一，是因為植株發育不整齊。要植株發育整齊，除需土地平整，開墾耕作均勻，肥力一致，施肥管理工作均一外，在定植時必須將同一種類(如吸芽、裔芽、冠芽)和一樣大小的種苗種在一起，以後發育結實才會整齊。

果實味不甜，原因很多。施肥不當為原因之一；因為鳳梨與其他果樹不同，施氮肥(硫酸銨或尿素)多果實才甜。除此，鳳梨園蔭影太多，也會使果實不甜。

泡沫，肌肉痙攣(蟲體侵入腦部所致)。
貧血：弓蟲寄生後，使紅血球破壞甚劇，以致發生貧血，各可視粘膜呈蒼白色。
下痢：重症者多有下痢(白痢或濃黃色)。
據外國報告，受妊母猪往往發生流(死)產或小產。大猪死亡率雖不高，

但有時耳朶、尾部糜爛脫落。
死猪作病理解剖時，最明顯的變化，就是肺水腫及各淋巴結的炎性腫脹，有時肝臟表面出現散發性壞死灶(粟粒大至米粒大灰白點)。我們在中擔鎮發現的病猪，在胃及腸間膜有水腫。

注意飼養預防

該病至目前尚無適當藥品可供預防，因此，只好在養猪工作上注意下列幾點，以避免被害：
①購買小猪時，要選購發育良好，呼吸正常，食慾旺盛者。
②要將猪舍四週環境衛生做好，一方面要防止鼠類野獸侵入。
③如不幸小猪病了，確定為本病，則最好將牠撲殺燒却，以免散播病原。
④發生該病的猪舍須作徹底的消毒，然後才可再用。

新藥尚未進口

該病治療，至目前為止，亦尚無確實有效的藥品。據報，磺胺類(沙發地亞淨，沙發美沙星，沙發沙吉西靈之類)稍有效果，但並不十分可靠。
最近日本有一位曾在臺大執教的獸醫專家小倉喜佐次郎博士，發明一種叫做「クローン」治療本病藥品，據館澤園之助博士報告，對本病病猪治療數十例結果，有百分之八十七的治愈率，但是該項藥品本省尚未有進口，目前本省已發現此病，應迅速引進該項藥品，以試防治，俾利猪隻增產。