



來信請多
利用明信片，
信中免除客氣
話，寫明姓名
住址，信的正
面註明「農問」。

化學藥品疏果

本省尚未使用



【問】：①未達結果年齡的柑桔類，因用人工摘花摘果太麻煩，有沒有較簡便而對母樹的生理上無害的科學方法（例如噴撒藥劑）？②柑桔類預防天牛的產卵方法，以那種較有效？（臺南縣柯芳登）

【答】：①在國外已有用化學藥品疏花果的，但在本省除用人工疏去花果外，尚未使用化學藥品疏去花果。②防止天牛產卵，在柑桔樹幹抹地特靈和塗抹石灰砒酸鉛水或溶劑都有效，以前者較佳。（王光全）

鳳梨施用NAA

抽穗率較電石高

【問】：鳳梨施用NAA與電石（後）同一環境和時期）至抽出花穗，其日數兩者有無差別？又抽出花穗之百分率，以何者為高？（屏東縣張清泉）

不需搭棚的葡萄整枝法

【問】：①據傳近有不需搭棚葡萄乙種，定植後兩年即可結實，確否？②上述葡萄苗

木，何處可以買到？③栽培管理等均請詳為介紹。（頭份鎮熊公冕）

【答】：①所謂不需搭棚葡萄，為葡萄整枝方法之一種，並不是新品種。②對於葡萄不搭棚之新方法，目前正由臺灣大學農學院與退役軍人輔導委員會在新竹縣試驗中。③在美國本方法已達實用化。主幹於地上部二公尺處行摘心外，每年對新枝均重行修剪，致使葡萄株成灌木狀，結果株如柳樹。（翁仁祿）

香蕉的中耕適期

【問】：本人種植一千株左右的香蕉樹，聽說在白露節以後中耕最適宜，確否？（高雄縣張阿寶）

【答】：香蕉中耕時期，以白露節左右為宜，因這個時候，雨季將過，土壤比較乾燥，中耕後容易發生新根。（朱慶國）


李樹的優良品種

【問】：生食加工兩用的優秀李子品種是那種？（苗栗縣陳旭日）

【答】：具備優良特性李的品種為黃肉李花螺李及紅肉李。（王光全）

水稻抽穗期補充氮素

對於收量並不能增加





【問】：我的一塊田中所種的嘉南八號蓬萊稻，插秧至今已六十五天，現在有缺肥現象，是否可用尿



品聖猪養

料飼合配全完友農



● 配 營 生 抗
● 料 養 長 病
● 正 豐 快 力
● 確 富 速 高


司公限有份股產生業農美聯

素葉面施肥，來補充氮肥之不足？（屏東縣王金城）

【答】：原來尿素是可以用作葉面施肥方法來補充氮素之不足，但生育達到六十五天時，已到將要抽穗的時期，再供給氮素，可能促使長出無效分蘗枝，而對於收量不會有好的增加。（吳啓東）

用愛多收處理種子

可使胡瓜提早收穫



【問】：有何種農藥可促進胡瓜及菜心提早收穫？
【答】：為節省育苗及移植之麻煩，擬催芽後即播種定植。因舊歷十一月，適氣候較為寒冷，擬以塑膠袋套於苗株，個別保溫，是否可以？
【答】：預防病蟲害，應備何種農藥？（臺南市福南農產物加工廠）

【答】：①促進胡瓜及菜心之生育提早收穫，宜用愛多收一〇、〇〇〇倍液，或增收素六、〇〇〇〇倍液處理種子，浸漬時間約十八二十小時。發芽後噴射「大生七八四」〇〇倍液時，再用愛多收或增收素作葉面噴射，其濃度與種子處理相同。②可以，但塑膠布不可蓋得過高，否則易被風吹倒。③胡瓜之病蟲宜噴射「大生七八四」〇〇倍液，於守瓜發生初期宜噴射賽文一、〇〇〇〇倍液，並噴射魚藤精預防蚜蟲。菜心噴射大生與馬拉松混合液防治病害及蚜蟲。（王進生）

每年三月至七月

外銷西瓜價格好

【問】：西瓜蜜寶種，品質良好，果型較小，適於外銷，但每年在三、四月間收成，是否適於外銷時間？蜜寶種西瓜在臺北市與其他品種的銷路如何？同一株數，是否優利於其他品種？（屏東縣王進朝）

【答】：本省西瓜，每年三月至七月，外銷香港之價格都很好，七月以後，因有日本及大陸上之西瓜競爭外銷市場的關係，價格較低。蜜寶西瓜極適於外銷用之栽培，其品

質極安定良好亦適於內銷，在臺北市市場之價格，與其他品種差不多。但因蜜寶西瓜果形較小，而省內市場均喜歡大西瓜，所以內銷用之西瓜，最好栽培一代雜交品種「富光西瓜」最有利。（陳文郁）

粉牆壁用加整品

不可用來種洋菇



【問】：①種洋菇所用的碳酸石灰，很像粉牆壁用的加整品（カセヒン），是否一樣？可否用來代替碳酸石灰？
【答】：建築材料店所售的牡蠣石灰，可否用來種西洋菇？（臺中市紀文河）

【答】：①培養西洋菇用的碳酸石灰，在化學結構上，與加整品不同，不能用來代替碳酸石灰。②牡蠣石灰不可用來培植西洋菇。（胡開仁）

剛採伐之榕樹

種植木耳較好

【問】：已乾燥了之榕樹，和剛採下之榕樹，是否均可種木耳？穿孔器何處有售？可用別種器具代替否？（彰化縣陳新利）

【答】：種植木耳以剛採伐之榕樹為好，乾燥的榕樹也可。穿孔器在臺南市安平路八號臺灣食用菇研究所施性忠先生處有售，每支約壹百貳拾元。不可用其他器具代替。（胡開仁）

木耳白皮病防治法

【問】：我於八月中種植木耳約原本五百斤，初成頗佳，至九月下旬，發現內有幾根所長之木耳呈白蟻狀（如所附病變木耳），繼則糜爛。初疑為水份過多，暫停給水，然而後來並未好轉，同時耳葉的萌芽與生長，均大為減退，請問是什麼病？如何防治？（臺南縣林安頂）

【答】：寄來木耳病標本，經鑑定名叫白皮病。防治本病的方法：一、將發病木耳除去。二、用四一四式石灰波爾多液噴撒（石灰四公分，硫酸銅四公分，水一公升）二至三次。三、改善通風，使空氣流通。

看！又一農業界的好消息

英國植物保護有限公司榮譽出品

『福施芬』五十號 'FOSFERNO' 50
(有效成分為巴拉松含量百分之五十パラチオン50%)

為使您的作物保持年年豐收 請速來用

『福施芬』五十號 'FOSFERNO' 50

特長 ① 成份準確 效力最強
② 信用最好 價格廉宜

鋁瓶原封現品隨時供應
包裝100cc 250cc 500cc 1000cc 詳細說明書備索

總代理
英商卜內門洋碱股份有限公司

臺灣特約總經銷
元山貿易有限公司

臺南市復興街十巷四二號 電話五七七五號




農民福音

茶油樹，豐收可靠，價錢好，不畏風雨，病蟲等害，用地不擇肥醜用途廣泛油可供食品，榮養豐富，柏可等肥皂洗滌衣服暨殺菌之用。本省各地可以栽培，特合東臺土質，東臺地曠人稀利用空地可獲一勞永逸。有需願望栽培農友從速可向敝廠索取說明書，當以無料贈奉種子有限需提早預備

茶油樹
Tea oil tree

新忠農榨油廠
號117村源富鄉德瑞聯蓮花
號 60254 字花撥劃政郵

茶油菜粒
Tea oil plant




(胡開仁)

一歲乳羊不發情 發育可能不理想



有一隻乳羊，已有一年多，並不過胖，但至今還沒有發情是甚麼原因？乳羊出生後幾個月才能發情？乳羊從生產開始，幾年後就不能生產了？(彰化市張宗哲)

【答】：①通常羊在出生六個月後，即達性的成熟期，但須視其體型的發育情形而定。如已到六個月，而體型尚小，仍以遲些配種為宜。可能你的小羊發育情形不修理想。②普通乳羊到五、六年以後，生產能力便衰退。(黃立群)

母羊乳汁為何不下放

【問】：敝人飼養之撒能母羊，因乳汁不能下流，致將連續二胎共五隻活潑小羊，均活活餓死，現因該老母羊產期又近，不知用何藥或何法，才可使乳水下流，以供小羊之食用？(花蓮縣仇志堅)

【答】：母羊產後乳汁不下放，究為何因，須先察看乳頭有無毛病，因此在此次分娩後，試施人工擠乳。如果有乳擠出則好，否則證明乳頭有毛病，有毛病之乳羊，當然不好，應予淘汰。下次分娩後，應就近請獸醫診察，如屬乳房炎，可由獸醫給藥治療。(林誠華)

母羊產後數日 不可使其交配

不可使其交配

【問】：羊大便呈稀糞或帶有米黃色粘液使糞粘在一起何故？②羊體內有寄生蟲時有何特徵？③母羊在產後一、二日，即有發情現象，此時是否即可使其交配？④母羊產後第二次受孕有何特徵？⑤羊患寄生病時，應用何種驅蟲藥？何處可買？(桃園鎮孫怡元)

【答】：羊便稀糞，表示胃腸不健全，或有慢性胃腸卡答兒，或有腸內寄生蟲所致，

此時必須仔細觀察，或檢查糞便，內寄生蟲有的肉眼可見，有的較細小不易看見，如你說的糞便中有米黃色粘液，可能是腸方面的疾病。②山羊有寄生蟲寄生時，被毛粗糙失去光澤，豎立，眼結膜蒼白，但食慾不常，日漸消瘦，糞便不正常，檢查糞便，可發見蟲卵。③母羊生產後一、二日不能交配，且生後一、二日，不會有發情的可能，而是公羊強迫交配之故。因生產後母羊之子宮尚未復健康，自然無排卵現象，交配怎能受孕？徒使母羊生產上發生不良後果。④生後第一次受胎仍有乳，但漸次減少，其特徵是腹部漸次膨大，不再有發情現象。⑤羊之寄生蟲很多，故用藥亦異，普通如胃蟲或其他腸內之圓蟲類的寄生蟲，可用 Phenothiazine，英國卜內門洋碱公司之芬樂維斯 Phenothiazine，對是類寄生蟲有特效，其服法可參閱說明書。(黃立群)

馬拉松與石灰質藥劑 最好相隔十四天噴射

最好相隔十四天噴射



【問】：噴射波爾多液後多久，才可噴射馬拉松？噴射馬拉松後多久可噴射馬拉松？(宜蘭縣游義雄)

【答】：此問題似在平馬拉松可能因鹼性而致減少其效力。此項影響，因氣候因素等而異。最好相隔十天至十四天，當較安全。(洪維慶)


噴射 DDT 後 蚊蠅不會即死

蚊蠅不會即死

【問】：用 DDT 水懸粉末噴射環境四周，對人畜有無損害？噴射後蚊蠅是否全滅？(彰化縣李永彬)

【答】：DDT 水懸粉，普通用於一錢留效果噴射，較好，即噴在牆壁上或傢俱，床板後面等等，噴射濃度為百分之五較為適當，即加二十倍之水。DDT 水懸粉之危險性較低，但噴射前仍須將食物蓋好，帶上口罩，噴射後並須洗手。DDT 效果屬於一遲效性，蚊蠅與 DDT 接觸後，需要較長時間才會死，並且一定要與噴射過 DDT 牆壁接觸始有效。所以不能期待蚊蠅馬上就全滅，蒼

野田式 耕耘機



◎詳細說明書函索即寄 ◎徵求各地代銷處
異定意較 優安滿比 性能保證 操作保歡迎
觀深強務 美最力服 新耕運誠
臺灣總代理 宏業商行農機部
臺北市重慶北路二段四號 電話：四二五九二



豐年牌農藥

◎檢驗合格登記證、農字第001 002 003號
興農化學工廠有限公司
公司：臺中市中山路一七五巷24號
電話：二六一九·三九六五
工廠：臺中縣大里鄉內新路五九號
(省農會後隣) 電話：4688

日本農藥株式會社出品
日農牌農藥

- ◎特製リノ展着劑
・加強農藥懸垂性，濕展性，固着性之聖品。
 - ◎特製スケルシン95
(高級夏油)
・柑桔採果後施用，清除越冬介殼虫蚜虫，蝨蟬卷葉蟲成虫及卵。
 - ◎カロージン合劑
(粉末狀松脂合劑)
・防治紅寶石石臘煤病葉膠介殼蟲。
 - ◎サルトン90
(極微粉水和硫黃劑)
・柑桔着色兼治蟲蟬白粉病。
- 原裝農藥，現貨供應

泰洋股份有限公司
TEL. 44994
臺北市重慶北路二段108號

大肥噢



料飼助補質礦命他維合綜素生抗

售均會農·店料飼
用請豬大養

卵產進促
病疾防預



所藥製源益

號二七二段三路福斯羅市北台

蠶對DIT多少已發生「抵抗力」，效果較差。(農復會衛生組)
中性肥皂展着劑
洗衣皂不可代用
[問]：用作展着劑的「中性肥皂」是否可用普通洗衣用的肥皂代用？(員林鎮張五藤)
[答]：中性肥皂，不可用普通洗衣皂代。(陶家駒)

蔡勇吉 米
陳蘭昭 米
陳富榮 米
蔡彪
謝金之 倉棉成 偕高來 高義親
張福陞
以上諸位農友的來信，已囑請專家答覆，請候本社回信。

永代農藥 TRADE MARK 信用最好

省政府檢驗合格農藥

核發登記證007 025 026號

請常用，政府檢驗合格永代的農藥！

巴拉松 乳劑 47%
P-E-M P M 乳劑 50%
馬拉松 乳劑 50%
安特靈 乳劑 19.5%
555EM 乳劑
草子·利美農

永代的農藥種子免！
信用好價格低廉！

進口優良農藥“好殺松50”鋁瓶裝

永代農化工廠

日中市成功路276號 電話4661號

PARATHION 50

HARVEST

MALATHION 50

誠徵各地經銷商

現貨大量供應
大生二十三，
大生七十八
可利生殺菌劑

250cc, 500cc,
1000cc. 錫瓦原裝



丹麥羅德新生物化學藥廠出品
Nordisk Alkali Biokemil Ltd



臺灣總代理
永興貿易行

本行：臺北市中正路三六三號
連絡處：臺北市重慶北路六十二號

電話：511, 1075
電傳：43356, 45811