



來信請多
利用明信片，
信中免除客氣
話，寫明姓名
住址，信的正
面註明「農問」。

化學藥品疏果

本省尚未使用



【問】：①未達結果年齡的柑桔類，因用人工摘花摘果太麻煩，有沒有較簡便而對母樹的生理上無害的科學方法（例如噴撒藥劑）？②柑桔類預防天牛的產卵方法，以那種較有效？（臺南縣柯芳登）

【答】：①在國外已有用化學藥品疏花果的，但在本省除用人工疏去花果外，尚未使用化學藥品疏去花果。②防止天牛產卵，在柑桔樹幹抹地特靈和塗抹石灰砒酸鉛水或溶劑都有效，以前者較佳。（王光全）

**鳳梨施用NAA
抽穗率較電石高**

【問】：鳳梨施用NAA與電石（後）同一環境和時期）至抽出花穗，其日數兩者有無差別？又抽出花穗之百分率，以何者為高？（屏東縣張清泉）

【答】：NAA與電石，如在同一時期同一地點施放，NAA花穗抽出期較電石約晚一星期左右，抽穗率如僅處理一次時，以NAA較高。（丘應樸）

**不需搭棚的
葡萄整枝法**

【問】：①據傳近有不需搭棚葡萄乙種，定植後兩年即可結實，確否？②上述葡萄苗



【問】：我的一塊田中所種的嘉南八號蓬萊稻，插秧至今已六十五天，現在有缺肥現象，是否可用尿

木，何處可以買到？③栽培管理等均請詳為介紹。（頭份鎮熊公冕）

【答】：①所謂不需搭棚葡萄，為葡萄整枝方法之一種，並不是新品種。②對於葡萄不搭棚之新方法，目前正由臺灣大學農學院與退役軍人輔導委員會在新竹縣試驗中。③在美國木方法已達實用化。主幹於地上部二公尺處行摘心外，每年對新枝均重行修剪，致使葡萄株成灌木狀，結果株如柳樹。（翁仁祿）

香蕉的中耕適期

【問】：本人種植一千株左右的香蕉樹，聽說在白露節以後中耕最適宜，確否？（高雄縣張阿寶）

【答】：香蕉中耕時期，以白露節左右為宜，因這個時候，雨季將過，土壤比較乾燥，中耕後容易發生新根。（朱慶國）

李樹的優良品種

【問】：生食加工兩用的優秀李子品種是那種？（苗栗縣陳旭日）


【答】：具備優良特性李的品種為黃肉李花螺李及紅肉李。（王光全）

**水稻抽穗期補充氮素
對於收量並不能增加**

【問】：我的一塊



**養豬聖品
農友完全配合飼料**



● 配 營 生 抗
● 料 養 長 病
● 正 豐 快 力
● 確 富 速 高

聯美農業生產股份有限公司