


(胡開仁)

一歲乳羊不發情  
發育可能不理想



有一隻乳羊，已有一年多，並不過胖，但至今還沒有發情是什麼原因？乳羊出生後幾個月才能發情？乳羊從生產開始，幾年後就不能生產了？(彰化市張宗哲)

【答】：①通常羊在出生六個月後，即達性的成熟期，但須視其體型的發育情形而定。如已到六個月，而體型尚小，仍以遲些配種為宜。可能你的小羊發育情形不修理想。②普通乳羊到五、六年以後，生產能力便衰退。(黃立群)

母羊乳汁為何不下放

【問】：敝人飼養之撒能母羊，因乳汁不能下流，致將連續二胎共五隻活潑小羊，均活活餓死，現因該老母羊產期又近，不知用何藥或何法，才可使乳水下流，以供小羊之食用？(花蓮縣仇志堅)

【答】：母羊產後乳汁不下放，究為何因，須先察看乳頭有無毛病，因此在此次分娩後，試施人工擠乳。如果有乳擠出則好，否則證明乳頭有毛病，有毛病之乳羊，當然不好，應予淘汰。下次分娩後，應就近請獸醫診察，如屬乳房炎，可由獸醫給藥治療。(林誠華)

母羊產後數日不可使其交配

不可使其交配

【問】：羊大便呈稀糞或帶有米黃色粘液使糞粘在一起何故？②羊體內有寄生蟲時有何特徵？③母羊在產後一、二日，即有發情現象，此時是否即可使其交配？④母羊產後第二次受孕有何特徵？⑤羊患寄生病時，應用何種驅蟲藥？何處可買？(桃園鎮孫怡元)

【答】：羊便稀糞，表示胃腸不健全，或有慢性胃腸卡答兒，或有腸內寄生蟲所致，

此時必須仔細觀察，或檢查糞便，內寄生蟲有的肉眼可見，有的較細小不易看見，如你說的糞便中有米黃色粘液，可能是腸方面的疾病。②山羊有寄生蟲寄生時，被毛粗糙失去光澤，豎立，眼結膜蒼白，但食慾不常，日漸消瘦，糞便不正常，檢查糞便，可發見蟲卵。③母羊生產後一、二日不能交配，且生後一、二日，不會有發情的可能，而是公羊強迫交配之故。因生產後母羊之子宮尚未復健康，自然無排卵現象，交配怎能受孕？徒使母羊生產上發生不良後果。④生後第一次受胎仍有乳，但漸次減少，其特徵是腹部漸次膨大，不再有發情現象。⑤羊之寄生蟲很多，故用藥亦異，普通如胃蟲或其他腸內之圓蟲類的寄生蟲，可用 Phenothiazine，英國卜內門洋碱公司之芬樂維斯 Phenothiazine，對是類寄生蟲有特效，其服法可參閱說明書。(黃立群)

馬拉松與石灰質藥劑

最好相隔十四天噴射



【問】：噴射波爾多液後多久，才可噴射馬拉松？噴射馬拉松後多久可噴射馬拉松？(宜蘭縣游義雄)

【答】：此問題似在平馬拉松可能因鹼性而致減少其效力。此項影響，因氣候因素等而異。最好相隔十天至十四天，當較安全。(洪維慶)


噴射 DDT 後

蚊蠅不會即死

【問】：用 DDT 水懸粉末噴射環境四周，對人畜有無損害？噴射後蚊蠅是否全滅？(彰化縣李永彬)

【答】：DDT 水懸粉，普通用於一殘留效果噴射，較好，即噴在牆壁上或傢俱，床板後面等等，噴射濃度為百分之五較為適當，即加二十倍之水。DDT 水懸粉之危險性較低，但噴射前仍須將食物蓋好，帶上口罩，噴射後並須洗手。DDT 效果屬於一遲效性，蚊蠅與 DDT 接觸後，需要較長時間才會死，並且一定要與噴射過 DDT 牆壁接觸始有效。所以不能期待蚊蠅馬上就全滅，蒼

# 野田式 175 耕鬆機



◎詳細說明書函索即寄 ◎徵求各地代銷處  
異定意較 優安滿比 性能保證 操作歡迎 觀深強務 性操保歡 美最力服 新耕運誠

臺灣總代理 宏業商行農機部  
臺北市重慶北路二段四號 電話：四二五九二



# 豐年牌農藥

◎檢驗合格登記證、農字第001 002 003號  
興農化學工廠有限公司  
公司：臺中市中山路一七五巷24號  
電話：二六一九·三九六五  
工廠：臺中縣大里鄉內新路五九號  
(省農會後隣) 電話：4688