

怎樣提高——

番茄晚疫病的防治效果？

朱啓魯

晚疫病是本省番茄嚴重病害之一，也是引起番茄栽培失敗的一個主要原因。噴施「大生」可以防治該病，但是想要提高防治效果，必需注意事前預防，改善施藥方法，並且同時採取其他必要的措施。

晚疫病是本省番茄嚴重病害之一，也是引起番茄栽培失敗的一個主要原因。噴施「大生」可以防治該病，但是想要提高防治效果，必需注意事前預防，改善施藥方法，並且同時採取其他必要的措施。

儘早發現病徵

此病通常侵害番茄的葉、莖、及果實等部位。發生於葉部時，先現出暗褐色病斑，好像被沸水煮過，然後在葉面呈霧狀白粉，並且漸漸擴大至正面。

為害莖部時，初呈暗黑色濕潤狀病斑，擴大後就腐敗。

如侵害果實時，呈灰色稍凹陷邊緣不明顯的腐敗病斑，遇潮濕時會生白粉狀物。

預防重於治療

噴施「大生」，可以防治該病，但是想要提高

(一) 此病病菌亦可侵害馬鈴薯，所以不要在馬鈴薯園附近栽培番茄。

(二) 番茄莖葉過於茂盛時，容易引起通風不良而助長病勢，所以下部葉必須酌量剪除。

(三) 本病多發生在排水不良的地方，因此，田間須注意排水良好，並注意不要在發病地區連作。

蔬菜的尿素葉面施肥

蔬菜行尿素葉面施肥，普通用〇・三％尿素液，但是省產尿素不太適宜作為葉面施肥之用，如果一定要使用，須把濃度減低至〇・一五至〇・二％。〇・二％稀釋液的配法，是在一千公斤水中加尿素二公斤。(王)

防治效果，必需注意事前預防，改善施藥方法，並應同時採取其他必要的措施。其防治法如下：

(四) 為預防發病，於病害尚未發生前，施用「大生」三至四百倍稀釋液，每十日噴射一次，連續四次。

如已開始發病，則可用「大生」或「大生七十八」四百倍稀釋液，每五至七天噴射一次。噴藥時，應特別注意噴射葉背，收穫前一星期須停止用藥，每次每公頃施藥量為八百至一千二百公升。



微病病疫晚茄番



親愛的柑農，果農及農友們，請特別注意，敝公司有下列「好速」現貨，小包裝供應：

好速「改良」除草劑

Ortho Improved weed-B-Gon

包裝：美國原裝四盎司小聽

·除草簡便，收效宏大·

(請參考豐年十一卷五期一〇頁)

(請參考豐年十一卷十九期三十四頁)

好速「福爾丹」50%

可濕性粉劑

Ortho Phaltan 50%W. P.

包裝：壹磅裝，敝公司監督分裝

·柑桔瘡痂病特效藥及防治·

·其他多種植物病害·

(請參考豐年十一卷六期十五頁)

製造廠：California Chemical Co.
ORTHO Division

總代理

嘉農股份有限公司

臺北市長安東路二段14號

北區聯絡處

臺北市重慶北路三段七〇巷五十號

電話：四六五〇四