

葉旺盛發生，矮小，由下葉漸漸枯萎，都於抽穗前枯萎。即使抽穗，亦多不結實。被害株的莖節上，常生鬚根，但地下根部發育不良，容易拔起，氣候乾燥無雨時，或秧田期間過長，較易發病。又第二期作比第一期作，蓬萊稻比在來稻被害較為嚴重。除水稻外，陸稻及雜草亦會發生「毒素」黃萎病。

在稻作病蟲害防治技術座談會中，專家對防治方法討論至為熱烈，認為防治水稻毒素黃萎病，必先消滅毒素的媒介黑尾浮塵子，而在秧田期間的預防工作至為重要。並商定緊急防治方法如下：

一、徹底撲滅黑尾浮塵子

秧田期 第一期作於播種後十五天左右，第二期作七天左右，即秧苗約五公分長時，噴射二五%DDT乳劑五百倍液，或撒佈一〇%DDT粉劑一次，並於插秧三天前再施藥一次，每公頃用量液劑八百公升，粉劑三十至四十公升，哇畔及田間附近之雜草地亦應施藥。


本田期 插秧後注意田間，若有黑尾浮塵子與螟蟲同時發生，應於第一次除草後，噴射「巴拉松」乳劑一千五百倍液，如僅有黑尾浮塵子發生，應噴射二五%DDT乳劑五百倍或五〇%賽文可濕性粉劑一千倍液，或撒佈一〇%DDT粉劑或一、五%賽文粉劑一次。以後每隔十五至二十天再施藥一次，每公頃用量液劑八百至一千二百公升，粉劑四十至五十公升。哇畔及田間附近之雜草地亦應同時施藥。

農藥粘着噴霧器 用後宜立即洗淨

石灰波爾多液及石灰硫黃合劑，常黏着於噴霧器的接縫中，侵蝕噴霧器，所以在噴藥以後，宜立即用清水洗淨，並噴清水，至噴出之水完全清淨為止。

藥劑不可以讓它留在噴霧器中太久，這樣會傷蝕噴霧器。通常噴霧器在噴藥後立即用清水噴洗清潔即可。

如欲用藥品洗滌，可將噴霧器拆開，把每個零件在「非肥皂」熱溶液中刷洗，再用清水沖淨。還有一點需要注意的，就是噴霧器是銅製的，銅比鐵耐蝕，不易生鏽，所以換配零件，不可換鐵製品。



(蔡)

二、拔除病株田間清潔

除去田間雜草 水稻收穫後，浮塵子都飛往稻田附近的雜草中潛伏，所以應清除田間的雜草燒去，或在哇畔覆土，以殺死越冬的黑尾浮塵子。

拔除病株 插秧三十天以後，隨時注意田間，如發現病株，即隨時拔除深埋土中。

翻犁稻田深埋殘株 發病地區水稻收穫後，應即犁翻稻田，將水稻殘株深埋土中，以免再生稻成為傳染的病源。

李信恆

武田老牌 最新農藥

武田滅爾

武田メル

水稻稻 銹劑 熱病 及各 乳劑 種果樹蔬菜 細菌病最新 特效藥

武田安特靈

武田エンドリン

乳劑 19.5% 水稻，旱地作物及果樹害蟲之防治

武田黴素

武田マイシン

水稻白葉枯病，柑桔潰瘍病，白菜軟腐病，馬鈴薯蕃茄疫病特效藥

武田飛佈達

武田ヘプタ

粉劑 適於缺水地區 土壤害蟲(甘 薯象鼻蟲，金 針切根蟲，黃 瓜等)之防治

日本武田藥品工業株式會社

臺北出張所

臺北市中山北路二段二二號之二

電話 49344 49345 49346

輸入元

立大貿易有限公司

臺北市太原路五五號三樓 電話：48170 41108