



注重母猪健康 可防猪仔腹瀉

假如您採取了左列各種措施，猪仔發生腹瀉的許多原因，就可因此消除：

- 一、不要從會患赤痢的仔猪中選留種猪。
- 二、不要使母猪在分娩時吃得過飽。
- 三、在妊娠期的最後數星期中，母猪的飼料內應給予少量的硫化鐵，或使其飼料中含有各種礦物質。

- 四、將分娩前和剛生產後，不要餵得太飽。
- 五、產房要打掃消毒。
- 六、母猪移入清潔畜舍之前，要用溫熱的肥皂水為牠洗擦全身。
- 七、猪的產房一定要溫暖，乾燥，無冷風吹襲。
- 八、要讓猪仔吸收足夠的鐵質，以防貧血病。

選用覆蓋物 可控制土溫

農友們如果希望利用覆蓋土面的方法，來控制土壤的溫度，就應該慎重選擇覆蓋物的種類。因為根據美國農部和肯薩斯農業實驗場的最近試驗結果，發現不同種類的覆蓋物，對於土壤的溫度，有着不同的影響。

譬如說，透明的塑膠，是可以提高土壤溫度的。在作物生育期間，有塑膠布覆蓋的土壤，在平時深處的平均溫度，為華氏九十四度，而沒有覆蓋的同一深處土壤，其平均溫度僅華氏八十四度。在深度為廿五吋的土壤中，有塑膠布覆蓋者，其平均溫度為華氏七十七度，無覆蓋者則為七十五度。

草藎是降低土壤溫度的覆蓋物。土面覆蓋草藎時，深度為半吋的土溫是七十五度，較無覆蓋物的土壤要低十度。在廿五吋深的土中，土面有草藎覆蓋時，其平均溫度較無草藎覆蓋的要低四度。

覆蓋物的顏色對於土壤溫度的變化也有影響。不同顏色的砂礫狀覆蓋物，曾被用作多種試驗，結果發現在黑色砂礫覆蓋下，半吋深處的土溫為華氏八十一度；而在鋁色砂礫覆蓋下，同樣深處的土溫為華氏七十八度。

如果您想使土溫在春季中迅速上升，自然以使用透明塑膠布作覆蓋為好。不過在生育後期陽光照射較烈時，就應該用草藎代替塑膠布，以免土溫過高，發生危害。(Crops and Soils)

花崗石碎粒 助母雞發育

以粉餌方式飼養小母雞，如果另外添加花崗石碎粒飼餵，比較未給與碎粒的，在二十週齡時每隻可以多增重〇.一磅，並節省飼料〇.二磅。緬因農業試驗場的基爾瑞先生說：這種差異在小母雞到達十四週齡後最為顯著。他從觀察中知道小母雞如果從小完全飼銀粉餌，到達二十週齡後，再加銀花崗石碎粒，對牠的生長和飼料利用率，並無改善功效。這些當然要看所用全粉餌中所含穀物碎粒或全粒狀態的不同而有差異。有些地區如果用粉碎穀物或全部高粱飼餵的時候，在飼料中再添加花崗石碎粒是必需的。(Poultry Tribune, August, 1961)

室溫適當變化 可提高產卵率

母雞在二十四小時內溫度相差三十五度，比較經常保持一定溫度的產卵成績要好。這是最近美國賓夕維尼亞大學穆勒爾氏觀察所發現的。同樣是在室內飼養，一群母雞在室溫從華氏五十五度漸漸升到華氏九十度，然後又慢慢降回華氏五十五度，每二十四小時循環一次的情況下，每隻平均產卵二八五粒，產卵一九〇個；而在室溫經常保持華氏五十五度

自由中國手屈一指 殺蟲藥廠

主要產品

工業級DDT	工業級馬拉松
工業級BHC	馬拉松乳劑
DDT水懸粉	巴拉松乳劑
DDT乳劑	馬巴乳劑
DDT粉劑	靈丹
BHC水懸粉	靈丹粉劑
BHC乳劑	24D除草劑
BHC粉劑	除蟻滅蠅粉

各地特約經銷處

臺糖公司內銷課	臺北市寶慶路二五號
陽明農具店	士林鎮大北路七九號
興村化學工廠	新竹市中華路三三號
源和西藥房	苗栗縣後龍鎮中正路
太原工業原料行	臺中市繼光街三三號
員林建興行	員林中山路二七號
中美農業資材行	虎尾鎮中山路一八號
豐益行	新營鎮中山路一三號
年豐農業行	嘉義縣義竹鄉六桂村
福源南號	高雄縣路竹一七〇號
豐南行	屏東市廈門街六四號
豐榮農藥行	臺東鎮中華路三元號

臺糖公司

高雄農業化工廠

工廠登記證工登字3392號

廠址：高雄雄市成功路二四號
電話：3666 4777

