

重症者經短時療學，呼吸困難而死。吃下少量的青酸，急性的步行踉蹌，骨骼肌痙攣，呼吸困難，心悸亢進，在數小時內死亡。
治療：可投與雙氧水，或過錳酸鉀。呼吸困難時注射「阿托品」。

四、甘藷中毒

甘藷患黑斑病，常含有一種毒素，使豬發生中毒。
症狀：採食後二日以內，呈肺炎症狀，或呼吸困難，結膜充血，腰痠等症狀。體溫也上昇。


治療：可用解毒劑，如丙種維他命為最有效；用量為含〇·一至〇·五公分的一%水溶液

，每五小時靜脈或皮下注射一次。此外亦可用強心、營養劑注射，或內服吐劑如吐酒石一至二公分，或硫酸銅〇·五至一公分促使嘔吐，或行灌腸。

五、動物飼料中毒

動物飼料中毒，多因攝食腐敗肉類，魚類或病死禽畜而發生。在應用廚房殘餘食物時發生較多。
症狀：通常多發高熱，嘔吐，下痢並現腦

治療：初期可投與吐酒石一%溶液二百立方公分，促使嘔吐。經過一小時後，再投與甘汞一公分，或芒硝一百公分的水溶液。



「石灰硫磺合劑」與「殺也特」 都是防治銹蟎的有效藥劑

蔡致讓

在本刊十一卷十一期「柑桔栽培管理及病蟲防治月曆」中，我們曾經提及應用「石灰硫磺合劑」與「殺也特」以防治柑桔病蟲害的問題。屏東市黃耀堂農友看了該文之後來信說，希望本刊對於上述兩種農藥的藥性及用法提出更詳細的說明。

「石灰硫磺合劑」和「殺也特」，都是防治銹蟎（造成果實象皮病的害蟲）的有效藥劑，但因藥性不同，用法各異：

- ①「石灰硫磺合劑」在夏天氣溫高時噴佈，易於引起藥害。
- ②「石灰硫磺合劑」不能與許多藥劑混合噴佈，例如「夏油乳劑」，「波爾多液」，「巴拉松」，「除蟲菊劑」，「魚藤乳劑」，「馬拉松」等都不能混合。但「殺也特」可以和這些藥劑混合。

③噴佈「石灰硫磺合劑」後，使果實果汁糖分增多，果皮着色提早，色澤美麗。明瞭這些藥劑特性後，我們就可以合理的運用它們了：

春夏期間，氣溫很高，不適於噴「石灰硫磺合劑」，在此期間，柑桔害蟲種類很多，如捲葉蛾，書紋蛾，鳳蝶，角肩椿象，銹蟎，紅蜘蛛等，我們不能為銹蟎噴「石灰硫磺合劑」，而不顧其他害蟲，所以這時宜應用「殺也特」加在其他殺蟲藥劑如「賽文」，「馬拉松」，「鐵定旺」，「大生七八」等中，一起噴佈以殲滅各種害蟲。到九月下旬時，噴一次「石灰硫磺合劑」，一面防治銹蟎和紅蜘蛛，一面可促進果實着色美麗。



會度 是行銀替門專
全安樣一保來領入
款存，管保出選
。選任



，通無是（費浪）開亂錢有
，行銀寄去採好上
，（益有）空有真管保行銀
。（利便）工省又全安分十



，知人驚錢有開世
，（中家）內厝成（可不）通曉錢有開世
，款真是錢有內厝
。來仔賊心搭夜日