

蛾侵害。

日本農林省正式介紹此法，但本省柑樹高株距密，被覆網後各種作業進行不便，且柑農向無使用經驗，所需細目網價錢高，柑農一時恐不能引用。

(三) 果實套袋法 採用較果實略大的紙袋或塑膠袋，塗敷DDT乳劑，套上果實，但應注意袋的通氣(可在袋底邊剪兩個小洞)，透光量，塑膠厚薄(○·○五公厘厚度即可防止夜蛾口吻插入)，色彩(以黑色為宜)等。

(四) 深煙法 在果園內，每○·一公頃掘穴約十處，穴深約二十公分，以木屑加用少量硫磺或BHC，放入穴內燻燒，即可使夜蛾迴避，不致侵入果園。但應在同一地區同時全面實施，始可收效。又在風雨夜晚即無法實施。

(五) 忌避劑防除法 將除蟲菊的石油浸出液，或BHC與除蟲菊的混合劑，撒佈於果園地面或果樹上，即夜蛾嫌忌其臭氣而不飛至果園內。

另有一種忌避劑，名叫「夜蛾眠」(ヤガミ)目前正在臺中縣東勢鎮試用中。將「夜蛾眠」

大肥噢

抗生素綜合他命礦質補助飼料



飼料店農會均售
養大豬請用

促進產卵
預防疾病



益源製藥所

台北羅斯福路三段二七二號



全靠豐年牌
農藥的效果

為何年年收成
那麼好。

豐年牌農藥

◎檢驗合格登記證、農字第001 002 003號

興農化學工廠有限公司

公司：臺中市中正路一七五巷24號
電話：二六一九·三九六五
工廠：臺中縣大里鄉內新路五九號
(省農會後隣) 電話：4688

什麼叫做「配合飼料」？

配合飼料是依照科學方法，用很多種普通飼料合在一起，再加上幫助生長和抵抗疾病的原料配合而成，包含各種成份。普通飼料則僅有一種成份，所以效果沒有混合飼料好。

本省除臺糖公司外，還有聯美公司所生產的豬用的混合飼料，名叫「農友飼料」，經本省檢驗局認定，成份尚屬完整，每臺斤售新臺幣一元九角二分。

液劑，放入空罐中，於被害害時間置於果園，即可產生強烈臭氣，使一般蛾類忌避飛走。

此法應在被害區域同時全面實施，否則蛾將集中加害於沒有施藥的柑園。

(六) 藥劑誘殺與人工捕殺法 利用落果，浸漬DDVP藥液後，掛在果樹下或田野間，誘集夜蛾，使夜蛾吸食中毒致死。

鳳梨果實剝除皮層，並注入少量DDVP藥液，掛在果園或林野間，亦可誘集夜蛾，並可在其齊集果實吸食時捕殺。

於被害時期夜晚八時至十二時，巡視被害果園，用人工捕殺夜蛾，亦可收效。

(七) 生物防治法 果實吸蛾類，有寄生蠅、寄生蜂、寄生菌等天敵。使天敵多量繁殖於害蟲活動棲息的林野間，即可抑制害蟲的猖獗。

以上各種防除方法中，除了人工捕殺法有一點效果外，更有效的防治方法，需要有關機關再做進一步的研究，希望果農們也多多提供你們的經驗和意見。

△農業小知識▽

▽Golden Muscat 葡萄果實一經成熟，即須採收，如遲遲不採，易於脫落。「爛果」可能因受蜂類吸食而發生，應在果實成熟前一個月套袋保護。(蔡)