




(。傷損無又，害病無美肥，節三有應蓮種的好)

## 有利的水生蔬菜

### 蓮藕栽培的準備工作

陳文郁

蓮藕又名蓮芋，為水生蔬菜的一種，近年來因外銷多，銷路好，栽培頗為有利。你希望在明年種植蓮藕嗎？請先做好選種、選地等幾項準備工作！

蓮藕（蓮芋，レンコン）為水生蔬菜的一種，很適合本省各地栽培。

蓮子用之栽培。（註：蓮的種子可供作藥用或製餅、炒食和製粉，藥用蓮子的價格一臺斤約十五元左右）。

#### 提早準備種蓮

蓮種的好壞，對於栽培成績影響很大，所以，種蓮應在前一年的採收季節，選擇肥美無病的小蓮芋供用。

種蓮宜在播種前掘取（最好是上午掘種蓮下午播種）。向外購用的種蓮，應多帶泥土搬運，以免過於乾燥而影響生根發育。

又掘取種蓮時，應注意不要損傷，且須全部掘出，至播種時，應挑選並加切斷為宜。

一株種蓮的重量約二百五十至三百公分，十公畝地（一分地）所需種蓮約一百五十至一百七十公斤（十公畝地所需的種蓮田約三公畝左右）。

如未自行留種蓮時，

#### 選擇適當土地

高溫多濕，日照充足，是最適於蓮藕生長的環境。溫度低時，根莖不發達，產量品質都不會好。在土質方面，則以肥沃的壤土，而且灌溉及排水方便的土地為最理想。

砂質地雖成熟較早，但病害多，根莖容易彎曲，形狀不佳，色澤也不好。

粘質地雖色澤外觀良好，但肉質較薄，品質和風味都不良好。又表土較深的土地雖可生產良品，但過深時因為根莖生長較深的關係，採收較為費工，所以，表土的深度最好不要超過四十公分以上。一般說來，以在過於肥沃而不適水稻生長的土地上栽培時最為有利。

#### 採用優良品種

本省現在栽培的蓮藕品種，有「紅花」和「白花」兩種。

「紅花」品種普通叫做「本地紅花蓮」，開花多，根莖約三至四節，形狀較為細小，一般供為收

### 日伏夜出的：蟬雞

#### 注意一不種易發現

#### 雞體外寄生蟲

雞體外寄生蟲是雞體外寄生蟲蟬雞的一種，白天潛伏於雞舍的小隙蓬裡，到晚間才爬出為害雞群，很不容易為農友們所察覺，但是被害嚴重時，母雞停止產卵，幼雞可能因而死亡，請農友們注意預防！

該蟲偶而也寄生於人、牛、馬、狗等。蟲體呈紅色或赤褐色，橢圓形。公蟲○.六×○.三公厘，母蟲○.七×○.四公厘，吸血後母蟲體長可達一至一.五公厘。母蟲於潛伏處產卵，夏季經兩天即孵化，脫皮成幼蟲。產卵後至成蟲發育期間約一星期。繁殖力很強，尤以晚春與初夏特別厲害。

此蟲吸食雞血，妨害雞安眠，並且引起羽毛脫落、貧血、活動力減退等現象。本蟲的生活力又很強，可耐數個月饑餓而不死。幼雞及產卵雞被害最為顯著。本蟲於晚春至初夏為害最大，白天也侵襲雞體中的母雞，因此而致死者不少。

因本蟲蟲體很小，又多於夜間出來為害，所以很不容易檢出。但如注意雞舍內的柱子或舍壁的裂縫，則可見到撒布狀的搖動白粉。要檢查附著於雞體的蟲體，則宜於夜間施行。又當人走近雞舍時常因該蟲而發癢，此時立刻檢查發癢部份，就可發現蟲體。

雞舍，尤其是本蟲容易潛伏的場所，都應完全消毒。藥品可用石油乳劑，BHC，DDT，氯化石灰，煤溜油酚肥皂液，ニユーキソール，ワクモソール（飼料店可以買得到）或石灰克達林混合液等，噴霧或散佈均可。但是此等藥品應每隔五天施用一次，連用三至四次始可完全防治。

預防法以木餵油原液塗擦雞舍（籠），簡單有效，且兼有木材防腐的作用，據說塗擦一次則可完全防治數年，但需塗擦每一個小裂縫，待充分乾燥後始可放入雞群。（李永基）