

，株距〇·五公尺、每一〇公畝施肥量，堆肥二〇〇〇公斤左右、並用豬糞尿追肥二次就可。若發生野蟲及小綠浮塵子，用馬拉松射就好，栽培食用向日葵經濟價值不高。(王進生)

防治棉花紅鈴蟲 不要使用巴拉松



【問】：棉株開花結蕾期中用巴拉松一千倍液防治大紅鈴蟲有效嗎？(嘉義縣太保鄉王火山)

【答】：棉花大紅鈴蟲，使用「巴拉松」一千倍液防治，效果一定是不好的；而且比時棉株已很高大茂盛，藥液容易沾到身上，恐有中毒的危險。防治藥劑可以使用一九·五安特騰四百倍，再混加七五DDT可濕性粉劑七五〇倍(或二五DDT乳劑二百五十倍)，每間隔十至十五天噴藥一次，要徹底噴射，使整株棉株都有藥液沾到為度。(游江海)

大雪山種果樹 應先調查風土



和防治病蟲？(臺中東勢孔價人)

【答】：敝人欲購買臺中大雪山土地栽培荔枝和柑桔，應該考慮那些自然因素？何處有專家代為分析土質？荔枝和柑桔每株產量多少？何地可購到種苗？何時種植？怎樣管理

【答】：敝人欲購買臺中大雪山土地栽培荔枝和柑桔，應該考慮那些自然因素？何處有專家代為分析土質？荔枝和柑桔每株產量多少？何地可購到種苗？何時種植？怎樣管理

【答】：一、你欲購的土地在大雪山內，如栽培荔枝柑桔，除需調查土質，地勢外，尚需調查氣候狀況，例如冬季最低氣溫，早春的雨霧情況，陽光、風、降雨量及分佈等，不知該土地海拔高度如何？日照量是否充足？
二、從地上所生長之植物發育可以約略知道土壤性質，若有問題再請專家分析，分

析土壤可與中大學農學院農業化學系接洽。

三、荔枝平均產量每株三〇—五〇公斤，每甲種一八〇—二四〇株；柑桔平均每株產五〇—七〇公斤，一甲種四〇〇株，以上都指成齡樹。

四、柑桔苗請向彰化縣永靖鄉五福村新高種苗園洽購；荔枝苗請向嘉義農學院試驗分所洽購。

五、三年生荔枝，柑桔苗可以在冬季栽植，植後柑桔二三年開始結實，荔枝約經四五年開始結實。

六、栽植株數見前，栽植工每工約可栽四至八株，包括掘栽植孔，挑施堆肥，栽植，灌水及立支柱，除草工視雜草發生情形而定。

七、柑桔荔枝病蟲害多，常需噴藥，其病蟲害防治法及施肥法請參閱專書。(蔡致讓)

栽培馬鈴薯 種薯要消毒

【問】適合水田裏作的馬鈴薯有那些品種？栽培方法為何？(臺中縣大安鄉鐘新城)

【答】馬鈴薯之栽培時期為十一月上中旬，適於水田裏作之品種計有男爵及農林一號，其栽培要點為：
一、種薯用烏斯普龍八〇〇倍液浸漬三分鐘消毒。
二、種薯切大片大小約三〇—三七公克，切口風乾後栽種為宜。
三、一〇公畝三要素施用量為氮一七一·八公斤、磷酸鈣一二·一四公斤，鉀一四一·五公斤。
四、栽植密度畦寬〇·七五公尺，株距三〇公分，所需種薯七五—九〇公斤。
五、採用畦溝灌溉，中耕除草第一次在萌芽(出土)後，第二次莖葉展開時，第三次株高二〇公分左右。
六、培土第一次三公分，第二次六公分深，為了避免疫病傳染塊莖，每株留二三芽。(王進生)

世界首創！植物蒸散抑制劑

現代農業不可缺少之營農資材。
日本「不二合成」榮譽出品
(專賣特許發明協會選定品)

久 綠 拿 Greener



這並不是「農藥」也不是「肥料」但知其效力者已開始使用效能勢將風行全省！

▲特效及用途

- ◎不分四季，隨時可以移植。
- ◎防止稚幼植物，在移植是枯萎凋謝。
- ◎使苗木在長途運送，活生生得送到種植地。
- ◎使蔬菜、生果類保持鮮度。(現有姊妹品富麗鮮專用)
- ◎防止蔬菜、青果、菸草、水稻、陸稻等一切農作物，在移植時的損害及枯死，同時促進最高成活率。
- ◎保護植物不受旱害、霜害、鹽害等。
- ◎加強植物其他農藥噴射的附着力。
- ◎不但可使幼苗至以高大樹木的移植可以成功。
- ◎可以使用於脫離季節性植物之移植且提早收效。

製造元：不二合成株式會社
總代理：永友商社

鮮度保持劑 (青果·蔬菜類)

青果外銷不可缺少之鮮度保持劑。
(日本食品衛生法指定品)

富麗鮮 Fresher



▲特效及用途

- ◎防止萎凋及重量減少。
- ◎保持如收穫時所有的天然外觀鮮度。
- ◎防止過熟所受損失，延長貯藏期間。
- ◎防止發生青黴及腐爛傳染於其他果菜。
- ◎減少輸送中，青果類蔬敗等之擦傷之皮面的損傷。
- ◎一般果類，例如柑桔、香蕉等之鮮度保持。

說明書備索

東京都豐島區日出町2の149
電話 (971)9769 (983) 1908
臺北市中華路200號之四
電話：30697