

花豆乾燥後脫粒

藏在鉛桶內最好




【問】：敝人所貯藏的花豆種子，發芽率在百分之四十以下，是不是貯藏不得法，應該怎樣改善？（宜蘭縣礁溪鄉何庚申）

【答】：花豆種子採收，應連豆莢曬乾三十四天，至充分乾燥後才可脫粒，脫粒後之種子不宜陽乾，尤其種子尚未充分乾燥就脫粒再繼續陽乾，更易減低發芽率。在成熟期遭淋雨，使豆莢發霉腐爛，或染患灰病病的種子，雖可脫發芽但在生育初期就枯死無法生長，種子脫粒調製中，種皮受損龜裂者也是減低發芽率的一個原因。將乾燥之種子裝在布袋或麻袋內放置於室內經過一年後之發芽率，據試驗結果，約七〇%左右，若布袋與地面接觸時發芽率僅五〇—六〇%，貯藏於鉛桶並密封，經貯藏一年後還有八十五%左右之發芽率。（王進生）

砂質黏質壤土

部宜種植水梨



【問】：桃園境內的土壤適於種植水梨嗎？應該施用什麼肥料？施量多少？（桃園鄉簡水坤）

【答】：一、梨樹需要土層深厚，排水良好的砂質壤土或黏質壤土，梨開花於早春，桃園地區在這個時候雨水太多，影響授粉作用的進行，使結果減少，故在桃園種植梨樹不很理想。三、必須以有機肥料與化學肥料配合施用，梨樹每株全年施肥量如左表所示：（一年分兩次施用，第一次在一月下旬，施堆肥全部，豆餅三分之一，其他肥料三分之二，第二次在九月底，施下所剩餘的肥料）。（單位：公斤）

【問】：何種氣候和土壤可以種植荔枝？本省所種荔枝目前是否有過剩現象？種荔枝的株行距要多少？可以與柚類間作嗎？何時種荔枝較好？應向何處購買優良樹苗？施肥方法如何？（嘉義中埔鄉何銘芳，雲林縣崙背鄉廖德盛）



壽命較短果樹

可與荔枝混植

【問】：一、荔枝所需的氣候條件為冬季較乾燥，無霜害，夏季高溫多濕。沙壤和紅壤都可種植，不過土層要深厚，陽光要充足。中埔鄉一帶如選地適當，應該可以種荔枝。二、黑葉荔枝的產量很可靠，價格也好，經濟價值很高，外國荔枝生產甚少而需要甚多。臺灣的荔枝可以加工外銷，不致有過剩問題。三、荔枝種植距離十公尺×十公尺，每公頃約種植一百株，為了提早收穫，種植距離可改為七×七公尺。每公頃約可種植二百株，追價冠擁擠時再間伐一百株，最後保留一百株。又荔枝可與其他壽命短暫的果樹，如木瓜、番石榴、柑桔等間作，柚類壽命甚長，不宜與荔枝混植。四、種植荔枝以颱風期過去後愈好，此一時期常在新曆十月中旬，種苗以蔴中頭家厝林水旭荔枝園繁殖者較多，價格若干，請逕函洽詢可也。五、施肥方法及時需視樹齡而定，未結果之幼齡樹，需每兩個月施肥一次（第一年宜每月施肥一次）。最好之肥料為豬糞尿，施用時濃度不可過大，已屆結果年齡之施肥時期為三月，五月，七月，九月以後不宜施肥。五、荔枝園之管理除充分施肥外，另須嚴防蟲害，尤以屆結果年齡時更須注意。（張振宙）

豆餅	過磷	硫酸	堆肥
三年生 0.250	0.010	0.010	0.010
六年生 1.130	0.010	0.010	0.010
八年生 2.000	0.010	0.010	0.010
十年生 2.500	0.010	0.010	0.010

最新驚人的植物ホルモン劑已出現!!

促進 農作物 提早收成 增加產量
純粹 — 植物生長綜合賀爾蒙劑 — 高單位
保證品質 一滴顯效



請即使用 快 豐 收 液劑

中央標準局註冊商標第12718號 AUXIN — H61

品質純美外貨 請比較使用 歡迎賜評
製造廠 神農化工廠出品
技術顧問 臺灣大學化學系助教授杜明和
廠址 南投縣名間鄉湖水村39號

※ 各地農會、農藥行、種子行、西藥行均有售
※ 徵求各地經銷處

人畜無害

請採用國貨 節省外匯 加速經濟發展

葉綠元之特點

- (1) 促進植物，生長及發育提高品質及增收。
- (2) 加強葉、莖、根，增加養分吸收力。
- (3) 促進着花着果提早成熟期。
- (4) 防止萎黃病，紋抗病抵抗稻熱病之病害。
- (5) 使葉莖之色彩鮮艷杜大。
- (6) 使用本劑可節省肥料施用。
- (7) 使用葉綠元可增加收成一成至三成。

葉面撒布劑

- 快豐收之特點 ·
- ① 增加作物體之生長，實果着花之速度並促進成熟期
 - ② 防止落花果改良品質增加產量，提早收成
 - ③ 增加發芽率促進活潑力
 - ④ 抵抗病蟲害並防止熱病等發生
 - ⑤ 增加產量二成至六成
 - ⑥ 快豐收品質絕對與他貨大不相同

說明書
試用樣品
付郵貳元
即寄