

用要淘汰一〇%，這樣算來，就只能養成健全的仔球二千九百六十八球。所以十公畝地所需的仔球，應有四十平方公尺的苗床始能供用，播種量為六、四公合左右。

### 注意施肥以促進仔球充實

苗床的肥料，也是影響仔球充實的重要因素之一。氮素過多，而且肥效過長時，鞘葉過於茂盛，易於引起病害，而且仔球充實差，頸部大，容易在貯藏中引起腐爛。所以，三要素配合應小心，最好在乾燥期之前，使它充實採收貯藏。

三、三平方公尺（一坪地）施氮素七十五公分，磷酐一百公分，鉀質七十公分左右，對於仔球發育充實均有良好效果。

### 噴射「大生」等防治病蟲

八、苗齡期（五—六葉）容易發生病害，應從本葉二枚時開始噴射「大生七八」四百倍液。

爲了防除蚜蟲、紅蜘蛛及刺馬等，宜噴射「馬拉松」一千倍液。

「馬拉松」與「大生七七八」可以混用，但須加用展着劑。仔球養成期間約九十至一百天，應每隔七天噴射一次，共七至八次。

### 地上部一半枯黃時採收

仔球宜選晴天露水已乾時採收。上午十時至下午三時最好。

通常在地面上部先端一半枯黃時開始採收。採收後陽乾三至四天，等鞘葉乾枯，仔球表皮變乾成紙狀膜後，放在竹簾繼續陰乾。晒乾時，最初一至三天不可重疊，以免發酵腐爛。

陰乾至仔球頸部縮小後，剪修鞘葉，用「西樂生石灰」粉拌和，裝入木箱中貯藏至八月。

### 柑桔園地面乾燥

花蓮縣玉里鎮嚴長玉農友來信說，他在該縣草溪鄉山地所經

遇苦旱不雨，葉子即呈軟弱，友人教他種植虎爪豆，不知是否有效？

像上述的柑桔園，是可以種植虎爪豆來防止地面乾燥的。但因虎爪豆生長迅速，爲防止天牛產卵及便利裾腐病治療起見，不可任其覆蓋至柑桔樹幹邊；樹幹周圍二至三臺尺附近的蔓條，都須刈除。


虎爪豆的播種適期爲二月中下旬。至夏秋開花前耕入土中。已種柑桔的土地，可在柑桔樹根分佈的外側，開掘寬一至一·五臺尺，深一·五至二臺尺的小溝，將虎爪豆枝蔓埋入，再用土上覆蓋。種子可向當地鄉鎮公所或鄉鎮農會購買。（翁仁祿）

### 可種虎爪豆保護

嚴的一片柑桔園，樹高雖已達五

尺左右，但因地質多砂少土，一

## 欲使畜禽肥壯



最佳驅蟲劑（內用）

陶氏杜蟲粉

DOWZENE \* DHC

美國 陶氏化學國際公司

台灣總代理 良友國際有限公司

台北市中山北路1段30號

電話：29361-4

### 驅除家禽猪畜體內寄生蟲

優點：

- 驅除大蛔虫、蛔虫、節虫及各種胃虫、效力達百分之九十八。
- 功效迅速、一日內見效、不影響飼養程序。
- 用法簡便、可與飼料混合或加水使用。
- 費用經濟、效力優異。

\* Trademark of The Dow Chemical Co., U. S. A.