

「安猪牛」藥新蟲驅畜家

欣 聯 張

家畜寄生蟲的種類很多，由於寄生部位的不同，我們通常把它們分成體內寄生蟲與體外寄生蟲的兩個大類。

這兩類寄生蟲，在寄生部位上既有內外之分，防治時所用的藥劑與方法也各不相同。防治外寄生蟲的藥劑，通常不能用來驅除內寄生蟲；驅除內寄生蟲的藥劑，也不能用來防治外寄生蟲。

可是最近西德拜爾藥廠出品的一種新驅蟲藥「牛猪安」，對於一般家畜的幾種內外寄生蟲，具有同樣優越的驅除效果，同時，還可以用來防治豬舍內外的家蠅、刺蠅、蛇等吸血性的昆蟲。

家畜寄生蟲種類很多，為方便計，我們通常把它們分成體內寄生蟲與體外寄生蟲的兩個大類。體內寄生蟲是寄生在腸胃內的寄生蟲。體外寄生蟲則專指寄生皮膚的寄生蟲。如以豬為例，豬蛔蟲與豬鞭蟲是體內寄生蟲，而豬虱與豬穿孔疥癬蟲就屬體外寄生蟲了。

這兩類寄生蟲，在寄生部位上既有內外之分，驅除時所用的藥劑與方法也各不相同。

對於內寄生蟲，我們常用口服藥劑；對於外寄生蟲，則用噴射、塗敷或浸浴的藥劑。

防治外寄生蟲的藥劑，通常不能用來驅除內寄生蟲；驅除內寄生蟲的藥劑，也不能用來防治外寄生蟲。

可是最近西德拜爾藥廠出品的一種新驅蟲藥「牛猪安」，對於一般家畜的內外寄生蟲，具有同樣優越的驅除效果。

該藥經口服時，不但可以殺死體內寄生蟲，同時因為它會被血液吸收，還可以殺死寄生在皮內或皮下的外寄生蟲。

如果噴射或塗敷家畜皮膚，不但可以殺死皮膚內寄生蟲，同時又因滲透力強的關係，能夠透過皮膚，經由血液殺滅較深部位的寄生蟲。

除此，又可以用來防治豬舍內外的家蠅、刺蠅、蛇等吸血性的昆蟲。下面就該藥的用法，以及使用上應該注意的

事項，簡單地介紹給各位參考：

防治外寄生蟲

牛壁蝨與豬羊的毛虱 使用○.一至○.二%的水溶液，洗擦或噴射家畜全身及舍內用具、舍壁等。五日後再施行一次。


猪疥癬病 使用○.三%的水溶液，洗擦或噴射家畜全身及舍壁，每隔五日噴射一次，至病狀痊癒為止；普通輕症者二至三次，重症者三至四次即可。一頭成猪，約需○.五至○.八公升藥液。

牛馬

蠅蛆病

使用一%溶液噴射或浸浴。因此藥滲透力強，能透過皮膚，經血流在數小時內殺死幼蟲，所以可以兼治身體內外各部的蠅蛆病。每頭成牛約需二至

約需二至



「安猪牛」可以採用防治一般家畜多種內外寄生蟲



大生二十二 防治 大豆紫斑病及病銹

各區域大豆常發生紫斑病，中部最為普遍。可於年發生，夏季最為嚴重，雨量增加常助其本病發生。

被害以葉片，豆莢及種子較為顯著。患部後期均為紫褐色，是名紫斑病。葉部病斑多呈不規則多角形。罹病葉上病斑多為大形，甚或多數病斑相結合，使葉片早枯死。種子被侵害時，使葉上形成紫紅色病斑。本病嚴重時種皮表面全部呈紫褐色。受傷害較早者種皮常發生橫走龜裂現象。

在幼苗期間可受侵害，但多發生於開花期後，是以防除應着重於大豆發育後期，尤以豆莢先實最為重要。收穫前半月如遇雨，更須注意無藥劑的噴霧。

播種後五十天有本病發生時，用大生二十二四倍稀釋液，每公頃八百公升，計每次用大生二十二四成半，約五百四十公升。大豆每公頃價值七元，即三千七百八十元。大生二十二藥劑按拉拔每磅四十元計算，共用五次每項總用二十二磅半總值九百元。淨增收入每公頃可達二千八百八十元正。

大生二十二亦能防治銹病，防治大豆銹病除與防治紫斑病在同一時期，撒佈大生二十二可同時防治紫斑病及銹病，甚為經濟。

函索說明書附郵票八角即寄



三十二生大裝國美
劑粉性濕可袋紙磅三
理代總灣臺
司公限有易貿象青
樓三號六五七一一路正中市北臺
七六四七二話電

三公升藥液。

犬毛囊蟲 對於毛囊蟲，防治效果也很好。使用〇·五至一%藥液，浸浴或洗擦，每隔二天施行一次，至病狀痊癒為止。又每公升體重口服〇·〇五公分，每隔二至三天服藥一次，連續三至四次亦可。

防治內寄生蟲

牛羊的捻轉胃蟲，毛樣線蟲，胃內蠅蛆 每公升體重用〇·〇七五公分，溶於二百至一千立方公分的水灌服。生長期的家畜，如果每隔二至三個月給服一次，對生長有益處。

豬鞭蟲，豬蛔蟲 每公升體重用〇·一公分，混於一餐的飼料給服，可在四十八小時內把鞭蟲、蛔蟲殺死，並將其排出。

對鞭蟲有一〇〇%的驅除效力，蛔蟲約有九十五%。一次給藥，可將兩種寄生蟲同時驅除，比其他任何驅蟲藥都好，而且省工經濟，尤其對鞭蟲，是唯一的特效藥。

防治家蠅

用〇·〇五至〇·一%的溶液，噴射畜體及厩舍


繁殖柑桔苗木

注意母樹選擇

個示範優良柑桔種苗圃。該圃今年育成的一「柳橙」一晚命夏兩種柑桔二萬餘株，所用的母樹，都是由臺中縣政府鑑選的。

農復會陸之琳技正到該苗圃視察，認為該批苗木生長確屬強健，可見繁殖柑桔苗木，自採取接穗開始，即注意優良母樹之選擇，是如何的重要了。

臺中縣霧峰鄉坑口村中南柑桔苗圃，是臺中縣政府指定的一



「蟲鞭豬」 寄生等內豬小的見常

內外牆壁，可以殺死聚集畜體的家蠅、刺蠅、蛇等吸血性昆蟲。
如在〇·一%溶液中，加小量的紅糖，盛於盤皿中，放置厩舍內誘殺家蠅，效果比現用的「馬拉松」等殺蟲劑安全可靠。

副作用輕微

按規定濃度或劑量使用本藥，絕不會發生任何副作用。假如超過濃度使用時，或會發生中毒。


中毒症狀輕微時，不施治療亦可復原。但是中毒過深者，則須使用一%硫酸阿托平（硫酸アトロピン）急救。牛用三至十立方公分，豬羊等用一至二立方公分，皮下注射即可。必要時，可繼續注射至中毒症狀消失為止。

△農業小知識▽

△鱷魚不可與鰻魚混養，因為它是食魚性的魚類，混養會減少鰻魚的養成率。但如放養少數，以便驅除池塘中的其他小雜魚或蝦類，則未嘗不可。（唐）

△母牛常常咳嗽，可能是受寒。在管理上應注意保持牛舍乾燥，多鋪墊草。同時應請獸醫詳細診斷給藥治療，千萬不要在市場上隨便購買成藥使用。（李）

△稻田施用基肥的時期，以插秧前最後一次犁耕時最為適宜，但是施肥前要先排除田水，犁耕後徐徐灌水，二三日內不可排水。（郭）



圖大放的蟲鼻疥孔穿豬與(右)蟲壁牛寄生等外畜家

愛多收

アトニツク



美多收

メタリツク

秋季作物及各種蔬菜

- 馬鈴薯**：愛多收 5,000 倍液葉面撒布可促進生長及增收。
- 麥**：愛多收 3,000 倍液於出穗五十一六十日前撒布可增加穗數及重量。
- 蕃茄**：愛多收 6,000 倍液於開花前撒布可落果，增進結實，增加產量。
- 其他蔬菜**：愛多收 6,000 倍液葉面撒布促進產量。

若愛多收及美多收混合使用可增加產量，提早收穫。

製造：日本旭化學工業株式會社出品

臺灣總代理：臺實貿易股份有限公司 臺北市太原路四四號

全省各地農會種子行、農藥行、蔗農服務社