

家畜驅蟲新藥「安豬牛」

欣聯張

家畜寄生蟲的種類很多，由於寄生部位的不同，我們通常把它們分成體內寄生蟲與體外寄生蟲的兩個大類。

這兩類寄生蟲，在寄生部位上既有內外之分，防治時所用的藥劑與方法也各不相同。防治外寄生蟲的藥劑，通常不能用來驅除內寄生蟲；驅除內寄生蟲的藥劑，也不能用來防治外寄生蟲。

可是最近西德拜爾藥廠出品的一種新驅蟲藥「牛豬安」，對於一般家畜的幾種內外寄生蟲，具有同樣優越的驅除效果，同時，還可以用來防治豬舍內外的家蠅、刺蠅、虻等吸血性的昆蟲。

家畜寄生蟲種類很多，為方便起見，我們通常把它們分成體內寄生蟲與體外寄生蟲的兩個大類。體內寄生蟲是寄生在腸胃內的寄生蟲。

體外寄生蟲則專指寄生皮膚的寄生蟲。如以豬為例子，豬蛔蟲與猪鞭蟲是體內寄生蟲，而豬頸與猪穿孔疥癬蟲就屬體外寄生蟲了。

這兩類寄生蟲，在寄生部位上既有內外之分，驅除時所用的藥劑與方法也各不相同。

對於內寄生蟲，我們常用口服藥劑；對於外寄生蟲，則用噴射、塗敷或浸浴的藥劑。

防治外寄生蟲的藥劑，通常不能用來驅除內寄生蟲；驅除內寄生蟲的藥劑，也不能用來防治外寄生蟲。

可是最近西德拜爾藥廠出品的一種新驅蟲藥「牛豬安」，對於一般家畜的內外寄生蟲，具有同樣優越的驅除效果。

該藥經口服時，不但可以殺死體內寄生蟲，同時因為它會被血液吸收，還可以殺死寄生在皮內或皮下的外寄生蟲。

如果噴射或塗敷家畜皮膚，不但可以殺死皮膚皮內寄生蟲，同時又因滲透力強的關係，能够透過皮膚，經由血液殺滅較深部位的寄生蟲。

除此，又可以用來防治豬舍內外的家蠅、刺蠅、虻等吸血性的昆蟲。

下面就把該藥的用法，以及使用上應該注意的

事項，簡單地介紹給各位參考：

防治外寄生蟲

牛壁蟲與猪羊的毛虱 使用〇·一至〇·二%的水溶液，洗擦或噴射家畜全身及舍內用具、舍壁等。五日後再施行一次。

猪疥癩病 使用〇·三%的水溶液，洗擦或噴射家畜全身及舍壁，每隔五日噴射一次，至病狀痊癒為止；普通輕症者二至三次，重症者三至四次即可。一頭成豬，約需〇·五至〇·八公升藥液。

牛馬

蠅蛆病

使用一%溶液噴射或浸浴。因此藥滲透力強，能透過皮膚，經流在數小時內殺死小幼蟲，可以兼治身體各部的蠅蛆病。



蟲生寄外內種多的畜家般一治防來用以可「安豬牛」

二十二生大

防治

病斑及紫豆大



各區域大豆常發生紫斑病，中部最為普遍。可全年發生，夏季最為嚴重，雨量增加常助長本病發生。

被害以葉片，豆莢及種子較為顯著。種子被侵害時，種皮上形成紅色病斑。本病嚴重時則多角形。葉部葉上病斑多為大形，甚或多數病斑相接合，使葉早枯死。種子被侵害時，種皮受害較早者種皮常發生橫走龜裂現象。

在幼苗期間可受侵害，但多發生於開花期後，是以防除葉重於大豆發育後期，尤以豆先施最為重要。收穫前半個月如遇雨，更須注意撒劑的噴撒。

播種後五十天有本病發生時，用大生二十二四百倍稀液，每公頃八百公升，計每次用大生二十二四百磅半。每十四日噴撒一次，連續五次。可增加產量四成半，約五百四十公斤。大豆每公斤價值七元，即三千七百八十元。大生二十二藥劑每磅四十元計算，共用五次每噴總用二十二磅半總值九百元。淨增收入每公頃可達二千八百八十元正。

大生二十二亦能防治銹病，防治大豆銹病係與防治紫斑病在同一時期，撒佈大生二十二可同時防治紫斑病及銹病，其為經濟。

函索農藥說明書附郵票八角即寄



三十二生大農原國美
劑粉性濕可袋紙磅三

代理總經理臺灣

司公限有易貿象青

樓三號六五七一路正中市北臺電
七六四七二二話