

三公升藥液。

大毛囊蟲。

對於毛囊蟲，

(蟲雌)

防治效果也很好。使用〇·五至一%藥液，浸浴或洗擦，每隔二天施行一次，至病狀痊癒為止。又每公斤體重口服〇·五公分，每隔二至三天服藥一次，連續三至四次亦可。

防治內寄生蟲



(蟲雄)

「蟲糞」蟲生寄內猪小的見常

內外牆壁，可以殺死聚集畜體的家蠅、刺蠅、虻等吸血性昆蟲。


如在〇·一%溶液中，加少量的紅糖，盛於盤皿中，放置廄舍內誘殺家蠅，效果比現用的「馬拉松」等殺蟲劑安全可靠。

副作用輕微


按規定濃度或劑量使用本藥，絕不會發生任何副作用。假如超過濃度使用時，或會發生中毒。

中毒症狀輕微時，不施治療亦可復原。但是中毒過深者，則須使用一%硫酸阿托平（硫酸アトロビン）急救。牛用三至十立方公分，豬羊等用一至二立方公分，皮下注射即可。

必要時，可繼續注射至中毒症狀消失為止。



圖大放的蟲糞齊孔穿猪與(右)蟲壁牛蟲生寄外畜家



用〇·〇五至〇·一%的溶液，噴射畜體及廄舍

防治家蠅

繁殖柑桔苗木

臺中縣霧峰
鄉坑口村中南柑

注意母樹選擇

桔苗圃，是臺中

個示範優良柑桔種苗圃。該圃今年育成的「柳橙」「晚命夏」兩種桔苗二萬餘株，所用的母樹，都是由臺中縣政府鑑選的。農復會陸之琳技正到該苗圃視察，認為該批苗木生長確屬強健，可見繁殖柑桔苗木，採取接穗開始，即注意優良母樹之選擇，是何的重要了。

(李) △稻田施肥的時期，以播秧前最後一次犁耕時最為適宜，但是施肥前要先排除田水，犁耕後徐徐灌水，二三日內不可排水。(郭)

農業小知識

△鱷魚不可與鰻魚混養，因為它是食魚性的魚類，混養會減少鰻魚的養成率。但如放養少數，以便驅除池塘中的其他小雜魚或蝦類，則未嘗不可。

(唐)

△母牛常常咳嗽，可能是受寒。在管理上應注意保持牛舍乾燥，多鋪墊草。同時應請獸醫詳細診斷給藥治療，千萬不要在市上隨便購買成藥使用。

(李)

愛多收

アトニツク

美多收

メタリツク



秋季作物及各種蔬菜

馬鈴薯：愛多收5,000倍液葉面撒布可促進生長及增收。

麥：愛多收3,000倍液於出穗五十一六十日前撒布可增加穗數及重量。

蕃茄：愛多收6,000倍液於開花前撒布可落果，增進結實，增加產量。

其他蔬菜：愛多收6,000倍液葉面撒布促進產量。

若愛多收及美多收混合使用可增加產量，提早收穫。

製造：日本旭化學工業株式會社出品

臺灣總代理：臺灣貿易股份有限公司 臺北市太原路四四號

全省各地農會種子行、農藥行、蔗農服務社