



來信請多
利用明信片，
信中免除客氣
話，寫明姓名
住址，信的正
面註明「農問」。

梨樹佛手柑

不宜用芽插



【問】：能用扦插法繁殖的果樹是否也可以使用芽插法？譬如梨樹和佛手柑可以用此法繁殖嗎？又發根素何處可買到？怎樣使用？（臺南三分子許文明）

【答】：一、梨樹，佛手柑雖均可用扦插法繁殖，但不宜芽插。
一般扦插苗，樹勢稍弱，樹命也較短，故須用鳥梨，及酸桔之實生苗為砧木行嫁接。

二、發根素 Rooton 可向臺北市迪化街一段臺灣農產企業公司購買，使用法可參考該藥說明書。（翁仁祿）

含有機磷農藥

會被石灰分解

【問】：本人田地附近圳溝內常有某工廠排出的石灰水，用此種水調合農藥，是否會減低藥效？（彰化縣水調合農藥）

【答】：多數有機磷農藥如「馬拉松」、「巴拉松」等，會被石灰所分解而減低藥劑之效力，但有些氯化態農藥如「安特靈」、「地特靈」、「阿特靈」却不會被石灰所分解，又水中如含有較大粒子之石灰，會將噴霧器之噴口塞着不通，故如用毒性大的藥劑，於施藥中途噴口被塞，千萬勿用嘴或赤手去把它

弄通，那是會引起中毒的，請注意！（洪維懷）

砂質壤土，宜種苦瓜



【問】：栽培苦瓜需要什麼樣的土質？栽培要點如何？在本地應於何時播種最適宜？怎樣防治瓜實蠅？（澎湖郭水壽）

【答】：苦瓜適宜在沖積土，即所謂砂質壤土上栽培為宜，其栽培方式與瓠瓜（菴瓜）大同小異，不過畦寬要大些，無須立架，讓它匍匐伸長（土面須敷草），但家庭栽培可以採用立架方式，在貴地（澎湖）應於一月下旬到二月播種較宜、苦瓜之品種有二種，一為小果種，品質較差、二為大果種，長二十五至三十分，橫徑十分左右的品質較好，經濟栽培應採用大果種，從播種至收穫開始期約需八十至九十天。

二、瓜實蠅（蜂仔）是苦瓜兩最大蟲害之一，而且瓜實蠅是純粹的熱帶害蟲，故在貴地發生可能較嚴重。該蟲為害果實，雌蟲產卵在瓜的幼果或莖內，幼蟲在內蛀食，使被害果變黃以至腐爛脫落地，其驅除法以「水解性蛋白質」四百倍加用百分之二五「馬拉松」可濕性粉劑四百倍水溶液，在雌花開花初期噴射，每四至五天噴射一次，但無須每畦每株噴射，僅噴射周圍之畦，每隔二畦噴射一畦，就可收誘殺撲滅之效。又可用五十%「蠟敵」可濕粉劑八百倍水溶液，

世界首創！植物蒸散抑制劑

現代農業不可缺少的營農資材。
日本「不二合成」榮譽出品
（專賣特許發明協會選定品）

久 綠 拿 Greener



經臺北縣政府建設局與本年炎熱的六月，以本劑處理一千株柑苗，移植於縣下各派出所，全部成活。

▲特效及用途

- ◎不分四季，隨時可以移植。
- ◎防止稚幼植物，在移植時枯萎凋謝。
- ◎使苗木在長途運送，活生生得送到種植地。
- ◎使青菜，生果類保持鮮度。（現有姊妹品富麗鮮專用）
- ◎防止蔬菜、青菜、菸草、水稻、陸稻等一切農作物，在移植時的損害及枯死，同時促進最高成活率。
- ◎保護植物不受旱害、霜害、鹽害等。
- ◎加強植物其他農藥噴射的附着力。

製造元：不二合成株式會社
輸出元：株永會社
總代理：株永會社



姊妹品 富麗鮮
人畜無害
◎◎◎◎
現貨供應

鮮度保持劑（青果·蔬菜類）

青果外銷不可缺少的鮮度保持劑。
（日本食品衛生法指定品）

富麗鮮 Fresher



▲特效及用途

- ◎防止萎凋及重量減少。
- ◎保持如收穫時所有的天然外觀鮮度。
- ◎防止過熱所受損失，延長貯藏期間。
- ◎防止發生青霉及腐敗傳染於其他果茶。
- ◎減少輸送中，青果類蔬菜等等之擦傷之皮面的損傷，
- ◎一般果類，例如柑桔、香蕉等之鮮度保持

說明書備索

東京都豐島區日出町2の149
電話(971)9769(983)1908
東京都千代田區神田東松下町三五
臺北市中華路200號之四
電話：30697·36583