

每五至七天噴射植株中部一次，每公畝三公升，效果甚佳。(王進生)

母豬發情期長

應該多次配種



【問】：八個月大的桃園種母豬經過三次人工授精，都未能受孕(每廿天發情一次，每次六天)，應該怎麼補救？(桃園內 羅虛芳)

【答】：母豬發情期能延長到六天，在本地母豬而言算是很長的了。交配不受胎，可能是配種時期不適當的緣故，通常豬隻配種多在發情後第二天舉行，但是發情期長者，除第二天配種外，每隔一日再配一次，直至發情停止為止，受胎才有把握。所以你的母豬下次發情時，可照上述方法試試看。如果沒有效果，只有將母豬淘汰，改為肉用豬。(李登元)

母牛初次配種

懷胎機會很少



【問】：怎樣檢驗母牛已否受胎？母牛發情期有多長？初次與公牛交配的母牛為何不易受胎？受胎後為何再發情？(嘉義梅山鄉陳良雲)

【答】：一、檢驗母牛有無受胎，應在其配種後一個半月左右，以手伸入直腸摸子宮之胎兒最為可靠，但這種工作應請有經驗獸醫來做。

二、母牛發情期為十二二十四小時。

三、母牛初經公牛交配，常較緊張而把交配後的精液用力擠出，所以受精的機會較少，甚至沒有受胎之機會。

四、母牛受胎後亦有再次發情者，但這種情形比較少。(李登元)

防治水稻紋枯病

用「阿蘇仁」多穗

【問】：我所種的稻，患了紋枯病，該用何種藥劑防治最有效？(彰化縣和美鎮阮錦貴)

【答】：可用「阿蘇仁」二千五百倍或「多穗」三千倍稀釋液，每公頃一千至一千二百公升，於分蘗最盛期施用一次，施藥時以噴射稻株下部為主，隔兩星期左右(孕穗期)再噴一次，此時藥劑應噴射全株。(簡錦忠)

青皮豆的播種期

【問】：青皮豆的播種適期是何時？每公頃施肥量和播種量各應多少？(花蓮縣豐濱鄉仇志堅)

【答】：一、青皮豆如果是以充作綠肥為目的者，應於霜降後(新歷十月二十四日)播種，才能收到更多的莖葉，如以獲豆粒為目的時，應在十月二十二日以前播種，愈早愈好。

二、供做綠肥的青皮豆，每公頃施肥量硫酸銨為一百至一百二十公斤，收穫豆粒的青皮豆每公頃施用硫酸銨三十至四十公斤，過磷酸鈣一百二十至一百五十公斤，氯化鉀六十公斤。

三、每公頃需要種子量，散播六十六公斤，條播五十公斤(余慶東)

早春定植無花果

多施堆肥大豆粕



【問】：無花果何時定植最好？株行距若干？施肥量和施肥時期的標準如何？(桃園龍潭程維新)

【答】：一、無花果以十二月至二月為定植適期。
二、株行距為三·六公尺×三·六公尺，每公頃種七五〇株。

最新驚人的植物ホルモン劑已出現!!

促進農作物 提早收成 增加產量 改良品質

純粹一植物生長綜合賀爾蒙劑—高單位 保證品質 一滴顯效

請即使用 快豐收 液劑

中央標準局註冊商標第 12718 號 AUXIN—H61

·快豐收之特點·

- ①增加作物體之生長 薺果薺花之速度並促進成熟期
- ②防止落花果改良品質增加產量提早收成
- ③增加發芽率促進活潑力
- ④抵抗病蟲害並防止稀熱病等發生
- ⑤增加產量二成至六成
- ⑥快豐收品質絕對與他貨大不相同

◎再出現一種新穎的微量元素綜合劑!!

促進植物生長回復原動力 加速生長 節省肥料 減少病害

請用 葉綠元 液劑

中央標準局註冊備案 Chlorophygen-M62

品質媲美外貨 請比較使用 歡迎賜評

製造廠 神農化工廠出品
技術顧問 臺灣大學化學系助教授杜明和
廠址 南投縣名間鄉濁水村39號

※各地農會、農藥行、種子行、西藥行均有售
※徵求各地經銷處

葉綠元之特點

- ①促進植物生長及增加產量。
- ②加強葉、莖、根、增加養分吸收力。
- ③促進薺花，薺果提早成熟期。
- ④防止黃萎病，紋枯病及抵抗稀熱病等之病害
- ⑤使葉莖之色彩鮮艷壯大。
- ⑥使用本劑可節省肥料施用。
- ⑦使用葉綠元可增加收成一成至三成。

請採用國貨 節省外匯 加速經濟發展