

够，種量最好不要重疊放置，使水分吸收平均，發芽整齊。

二、莖之發芽適溫為攝氏二〇至二五度，故在攝氏二五度發芽快。

三、經過醱酵腐熟的堆肥不會影響莖之生育，但應將腐熟堆肥放在株間或兩旁為宜。

四、莖之發育最低，需要攝氏十五度以上，故當地晝間之氣溫能昇高至攝氏十五度以上時，隨時可以栽植，但夜間之氣溫不可降低至攝氏十度以下（易腐爛），若採用催芽，似可在二月下旬定植，最好清注意觀察貴地之歷年氣溫情形而決定栽植期為宜。（王進生）

花生種子先消毒

可免白絹病為害



【問】：本人所種花生最近發現植株有枯萎現象，根部也多枯爛，附上標本，請鑑定屬於何種病害，應如何防治？（臺南縣將軍鄉吳和）

【答】：根據寄來的樣本鑑定，你的落花生患了白絹病，此病如施行種子消毒，即可預防，消毒方法是「西樂生」或賜保根殺菌劑，於播種前舉行拌種、每公升花生仁果，用「西樂生」或「賜保根」四公分混拌，常發此病的土地，不要連作。（簡錦忠）

臺灣一號落花生

最宜在新竹栽培

【問】：本地土壤是酸性黃色粘土，可否種植花生？以採用那一品種較好？種植落花生可以施水肥嗎？（楊梅埔心李樹賢）

【答】：一、楊梅地區酸性黃粘土在春季可種花生，但須注意幾點，①整地耕耙時須細、②播種時土壤宜有水份，以免乾燥，影響發芽、③須多施堆肥，在整地耕耙時施用。二、目前推廣之落花生品種「臺灣乙號」

「極適於新竹地區栽培，本年春季全省落花生團體競賽第一名之臺中北埔及苗栗後龍，就是種植該品種。

三、落花生是否可以應用水肥，還無根據，但落花生是豆科作物，應用水肥可能有徒長之現象，同時施用水肥費時甚多，還是以用化肥堆肥為佳。（林興）

「山道年」驅蛔蟲

成本很高不合算



【問】：五頭豬每頭重約五十斤，每次共服用山道年〇·三五公分，但不能發生驅除蛔蟲的效果，原因何在？有沒有比山道年更有效的藥劑？其他驅蟲藥要與下劑併用嗎？（苗栗頭份鎮鍾運龍）

【答】：一、照來信所說，是因為「山道年」用量不足，重五十斤的豬隻每次用量就要〇·三五公分（瓦），「山道年」驅除豬蛔蟲是有效的，但因價貴現在多不採用。二、目前採用的豬驅蟲藥中即含有氯化鈉，農會推廣的豬驅蟲藥中即含有氯化鈉，應用此藥無需用下劑。三、應用農會的驅蟲藥較為保險，至於用量應切實依照仿單說明給與。（李登元）

讀者服務部小啓

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 游進旺 | 黃啓漳 | 林瑞呈 | 李旭輝 |
| 陳明炎 | 羅健鷗 | 謝江村 | 劉南薰 |
| 張浩淵 | 張添丁 | 李雲茂 | 李連勝 |
| 詹進通 | 陳欽炳 | 謝進聰 | 王懷芝 |
| 高國連 | 彭庚銅 | 謝志青 | 郭維藩 |
| 林炳輝 | 史云亭 | 田金來 | 陳英仁 |
| 何銘芳 | 蘇長庚 | | |
- 以上各位農友的問題，已轉請專家解答，請等候本社答的回信。

大肥噢

料飼助補質礦命他維合綜素生抗



售均會農店料飼
用請豬大養

卵產進促
病疾防預



所葯製源益

號二七二段三路福斯羅市北台



全靠
豐年牌
農藥的
效果

為何
年年收成
那么好

豐年牌農藥

◎檢驗合格登記證、農字第001 002 003號

興農化學工廠有限公司

公司：臺中市中正路一七五巷24號
電話：二六一九·三九六五
工廠：臺中縣大里鄉內新路五九號
(省農會後隣) 電話：4688