

請用

# 肥羅歐

輔助飼料

## AUROFAC\* A

FEED SUPPLEMENT

### 畜牧常識

以後各期在本頁中均將提供飼養禽畜最新技術資料敬請按期參閱

促進生長 預防疾病  
增加生產 節省飼料  
縮短時間 增進收益

母猪生產時應注意事項：

一、懷孕母猪如飼養管理良好，並經常飼用歐羅肥則可避免難產之發生。

二、母猪生產時應使保持安靜，剛生下之仔猪必須注意鼻腔內有無裂膜阻塞，必需先行排除，以免因塞住鼻腔，引起窒息死亡。

三、母猪之生產時間前後歷時約為四小時左右

，每間隔四一五分鐘生下一頭，生完以後二小時內胎衣應自動落下，落下之胎衣要燒掉或掩埋。如超過時間胎衣未落下，應請獸醫師診察。

四、生下之仔猪必要求吃初乳，因初乳營養份極高，並含有各種抗體，仔猪吃了初乳後很快就可以將胎糞排出。

五、仔猪吃乳是按定位的，體弱的仔猪應該以人工協助其吃前面幾個乳頭，因前面乳頭乳量較多

，可使體弱的仔猪與整群同樣得良好營養。



六、仔猪吃乳關隔，白天為二小時吃一次，晚上每隔四小時吃一次，如採用人工哺乳法時應特別注意吃乳之時間。

七、仔猪之臍帶應於生下後即行剪斷擠出污血。剪擠帶之器具應注意消毒，以免引起細菌的感染，而導致發炎或其他傳染病。

八、生產後的母猪身

體有發熱狀態，所以在生產後廿四小時內不要供給任何飼料，只要給以飲水。廿四小時後開始餵料，第一天只需供給半磅飼料，第二天加多一倍，以後慢慢增加至十四天後可以吃全量飼料。

九、產後之母猪，飼料中應添加歐羅肥，以恢復其身體健康，仔猪滋槽飼料或人工哺乳代乳料中亦應加入歐羅肥，以促進其生長，並防止下痢的發生。



## 台灣氰胺股份有限公司出品

註冊商標\*



分銷處：

屏東縣	惠農行
高雄縣	義順行
臺南縣	裕農行
嘉義縣	永和行
雲林縣	永豐行
彰化縣	豐行
彰化縣	豐行
南投縣	豐行
苗栗縣	豐行
花蓮縣	豐行
臺東縣	豐行
桃園縣	豐行
新竹縣	豐行
宜蘭縣	豐行

屏東市	中山路11號之2
高雄縣	岡山鎮平和路151號
臺南市	建國路216號
雲林縣	斗南鎮中山路116號
臺中市	忠孝路285巷25號
花蓮市	中山路322號
桃園鎮	民族路57號4
宜蘭縣	蘇澳溪鄉大義村45號