

其他注意事項

①肌肉用疫苗的有效成分，很容易沉澱，透明的上層液，毫無免疫效力，所以每次使用時，應於抽出疫苗前，充分振盪使混合均勻，抽出後也須迅速注射，以免因沉澱而影響效果。

②注射器具應行煮沸消毒十五分鐘以上。注射部位應以七十%酒精棉拭清後方能注射。疫苗宜保持清潔，以免雜菌混入，效力減弱。

③本疫苗的保存，如一般生物藥品一樣，宜貯於冷暗處（攝氏二至六度），但不能使它凍結，以免影響效力。在農村裡，有人將疫苗

寄存冰店而任其凍結，這是應該避免的事情。

④疫苗啓封後，必須即時用完，隔日的藥液就不能使用。

⑤已經感染新城雞瘟的雞群，不能再注射本疫苗，注射不僅無效，且有傳播病原的危險。

⑥在發病區使用，必須由健康雞群先行注射。

⑦以上所說的，只是關於肌肉注射用疫苗的使用，在新城雞瘟病防治上，還須配合其他的預防對策，如雞舍及飼養器具的消毒，種卵的選擇與消毒，孵卵器的消毒等，都是很必要的工作。萬一發病時，病雞的撲殺與消毒，也須徹底執行。

白色黑色胡麻，栽培方法相同！

本省主要的胡麻品種，可以分爲黑胡麻及白胡麻二種。播種適期，在四月至五月，氣溫變化愈少生育愈好。排水良好的壤土乃至粘質壤土，都可以栽培。每公頃播種量，約爲八至十公

斤，可由發芽率高低決定。撒播、條播均可，但爲開拔、除草、中耕等工作方便，以條播較爲適宜。將種子與河砂混合，增加體積後播種，較爲方便。

行距及株距，則由土壤肥瘠而定。普通行距爲五十至六十五公分。株距在第一次間拔時留六至八公分；第二次間拔時留十五至二十公分。

每公頃應施五千至六千公斤土糞，或五千公斤堆肥。此外還須施用過磷酸鈣二百公斤，及氮化鉀一百公斤左右，以提高產量。採用無肥栽培，生育較差。

病害及防治方法如下：

青枯病（立枯病）：①不可與煙草、茄子、番茄、馬鈴薯、花生等輪作。②注意排水，不可傷根。③病株須早期拔去。④發生青枯病的土地，在四至五年內不可栽培胡麻，但改爲水田後，經半年即可再栽培。

細菌性斑點病：①採用不帶病菌的種子。爲了安全，最好先用一千倍「烏斯普龍」液浸漬一小時。②採集病葉，立即燒燬。③噴射六斗式波爾多液。④氮肥不可太多。


防備耕牛被盜！

據臺北縣新店鎮農會總幹事王毓財先


生說，在去年（五十年）五月廿七日至八月十一日，爲時僅僅二個半月期間，該鎮居民曾被偷去二十六頭耕牛，其中十五頭被盜獲追回，而另外十一頭則迄無踪跡。耕牛是農友們的主要財產，也是重要的生產工具，請農友們加意防備才好。（猷）

葉枯病：①種子須用一千倍「烏斯普龍」液消毒。②選陽光照射良好的土地栽培。③噴射水銀劑加波爾多液，噴射六斗石灰波爾多液亦可。


蟲害可照一般旱作防治。（晉姓）



阿義哥，好福氣，只可惜，愛操枝，小茶館，妓寮裡，風化區，時常去。



阿義哥，失注意，數天後，毒發起，難爲情，不肯醫，因好色，傳染妻。



家庭間，從此起，夫妻倆，鬧不離，風流病，害自己，最冤枉，累子女。