


來信請多
利用明信片，
信中免除客氣
話，寫明姓名
住址，信的正
面註明農問。

麻豆文且施肥標準



【問】：麻豆文且定植後應用何種肥料？數量該多少？施肥時期如何？可以施用豬糞尿嗎？（彰化田中蕭櫻春）

【答】：麻豆文且的施肥標準如下（每

樹齡	肥料種類	硫酸銨	過磷酸石	硫酸鉀
施肥量	(克)	(克)	(克)	(克)
第一年	一六〇	二六〇	一三〇	
第三年	三九〇	三九〇	一九五	
第五年	五二〇	五二〇	二六〇	
第十一年	一一七〇	一一七〇	五八五	
第廿一年	二四七〇	二四七〇	一二三五	

分正月春芽發生前一次，五月一次及九月一次共三次。二、如有充分腐熟之豬糞尿，在冬季每株加施一〇公斤（五年生的樹），二〇公斤（十年生的樹）或三〇公斤（廿年生的樹）。對於麻豆文且的發育，更屬有利。

稻種消毒可防「稻公」


【問】：稻公應怎樣防治？此病發生的原因是什麼？（屏東縣高樹賴福安）

【答】：防治稻公徒長病（稻公），須要施

行稻種消毒，即播種前用谷樂生一千倍水溶液，浸種一小時，然後洗淨，催芽下種，又

本病害之發生原因為①本病原菌在被害粟或穀粒上的孢子有二年以上，在組織中的菌絲有三年以上的生活力，以在組織中的菌絲為主，在發芽時侵害，又在開花時期的感染為次期的傳染根源，故採此種稻種或收穫時損傷者發病為多。②早秧田比水秧田發病多。

母猪不肯餵奶 多因乳頭有傷



【問】：母猪生產後，突然不讓仔豬吃乳，有何對策？（雲林縣大埤鄉陳炳木）

【答】：一、母猪不願哺育小豬，應先檢查母猪乳房有無腫脹發炎或癢破受傷等情形，如有發炎或傷口，要立刻請獸醫治療，治好後就可恢復正常。

二、沒有豬奶吃的仔豬可應用人工哺乳方法飼養，此法是利用小孩吸乳的乳瓶與乳頭，瓶內裝牛奶，並參少量開水，或脫脂乳粉與溫開水調成乳水（水九份脫脂乳粉一份之比例），第一週每隔二小時餵一次，每次約十五分鐘，第二期每隔三小時餵一次，以後餵與次數可逐漸減少。

三、母猪產後最初數日餵料不宜太多，產後的餵量應由小量逐漸增多，通常到兩星期後才給與全量，以預防乳房發炎。有的小

臺糖公司高雄農業化工廠

產製農藥 首屈一指
溶劑提油 效率最高

廠址：高雄市成功二路四號 電話 四七六六
臺北銷售處：臺北市寶慶路二十五號

殺蟲 牌角六

- 主要產品
- 工業級DDT
 - 工業級BHC
 - DDT水懸粉
 - DDT乳劑
 - DDT粉劑
 - DDT水懸粉
 - BHC乳劑
 - BHC粉劑
 - BHC水懸粉
 - 工業級馬拉松
 - 馬拉松乳劑
 - 馬拉松粉劑
 - 馬巴丹乳劑
 - 靈丹粉劑
 - 24D除草劑
 - 除蟬滅蝨粉
 - 工業級DDVP
- 特約經銷商
- 興村化學工廠 新竹市中華路三六六號
 - 源和西藥房 苗栗縣後龍鎮中正路
 - 太原工業原料行 臺中市繼光街一三二號
 - 員林建興行 員林中山路一一七號
 - 中美農業資料行 虎尾鎮中山路一八號
 - 豐益行 新營鎮中山路一九二號
 - 年豐農業行 嘉義縣義竹鄉六桂村
 - 福源商號 高雄縣路竹一七〇號
 - 豐南行 屏東市夏門街六四號
 - 豐榮藥業行 臺東鎮中華號二一九號
 - 各地蔗農服務站

嘉禾牌 豆粉

品質：含蛋白質44%以上

用途：飼養家禽、家畜、養魚

出售地點：高雄本廠、各地農會

歡迎採購 敬請批評