

肺炎

肺炎發生的原因很多。猪舍不潔冷濕，是原因的一種。感冒寄生蟲寄生，也會誘發本病。在氣候方面，普通以冬季容易發生，尤其是出生後不滿四個月的小猪，與體質衰弱的猪，在此季節中最易染患。

症狀 主要症狀為呼吸急促，咳嗽，沒有食慾，怕冷發抖，發熱，胸部發痛，眼結膜潮紅，精神沉鬱。經過急性時，常呈急性纖維性肺炎，有時也會轉為慢性肺炎，或併發其

他病症。

防治 ①注意飼養管理，去除發病原因。

②病猪宜使溫暖安靜，猪舍要清潔通風，多數褥草，並供給營養容易消化的飼料。③早期治療可內服或注射磺胺類藥以及抗生素藥。常用者如磺胺二甲嘧啶 (Sulfamethazine) 粉劑，二五%磺胺二甲嘧啶鈉溶液 (Sodium Sulfamethazine)，併微素 (Penaguan-mycin) 等，都有著效。又新近應用約〇.三%可溶性金微素粉 (Aureomycin Soluble) 溶液飼喂，對肺炎的防治效果也很好。

荔枝栽培的五個問題

張振宙

一、荔枝喜歡何種氣候，何種土壤？

荔枝喜歡溫和而冬季無霜的氣候，開花時天氣宜晴朗，氣溫宜穩定，如冷熱不定，可影響荔枝受粉，導致落花落果。

最適於荔枝生長的土壤，為沖積的沙壤土，有機質豐富且土壤水分充足。尤其在開花結果時期，土壤不宜乾燥，否則，可使花果大量脫落。

二、一分地可種多少株？

荔枝的種植距離，需十×十公尺，或一公頃種植一百株。過去農家所種荔枝多嫌過密，影響產量很大。種植初期，宜與其他作物或短期果樹間作，以期充分利用土地，增加早期收益。

三、何處有樹苗出售？

目前臺灣最有經濟價值的荔枝品種為黑葉（烏葉），臺中頭家厝及霧峰等地所栽培的，大多數是這一品種；該兩地都設有荔枝苗圃，供應種苗。如需其他糯米糕、桂味、淮荔等品種，請向嘉義農業試驗所洽辦。

四、何時種植最為理想？

種植荔枝最理想的時期是國曆一、二月，此時氣溫最低，種植後較易成活。

五、種植時，有無特別需要注意之處？

種植荔枝時，需注意下列事項：

- ①植穴直徑至少需二尺，深二尺。每穴施腐熟堆肥至少五公斤。
- ②種植後，需設支柱，保護幼苗不致動搖。同時在幼苗基部敷蓋草葉，保持土壤濕潤。冠部須設臨時遮蔭，以防日炙。每日至少需澆水一次。
- ③最忌在九月以前種植荔枝，其原因有二：一為在九月以前氣溫過高，幼苗最易枯死；一為九月以前時有豪雨或颶風，不易保護。



各農友，
請注意，
沒有病，
查身體，
先預防，
您要記，
患着病，
要速醫。



各種病，
皆能醫，
有了病，
莫猶豫，
莫迷信，
誤了時，
最安全，
醫院去。



各種癌，
亦如是，
一發覺，
速醫治，
常檢查，
莫遲延，
早治療，
不會死。