

木柵鄉後壁坑大華農園或五股鄉袋字安金泰興農園購買。(翁仁稼)

赤嵌花菜，八十天收穫

【問】：十一月上中旬可以種赤嵌種花菜和長岡四季甘藍嗎？何處有種子出售，自定植至初收穫時多少天？(出栗鎮徐輝安)



【答】：一、赤嵌種花菜於十一月上中旬播種，其花球較小，長岡四季獲十一月中可以播種，產量尚高，以上品種三重鎮重新路與農種子行有種子出售。

二、赤嵌花菜如在十一月上中旬可播種，每花球重平均可達到二十三萬斤，如在十一月上旬播種者，自定植後至初收所需日數約七十五至八十五天。(王進生)

香瓜黑星病的防治

【問】：敝人所種當地香瓜在開花結果的初期，一切都很好，但到十月初旬，連續下了兩天雨後，蔓稍的葉上發生斑點，逐漸變成黃金色，然後逐漸蔓延，終至全株枯萎，經檢查根部，並無腐爛現象，請問這是何病？應如何防治？(臺南市水交社陳長漢)


【答】：據來信的敘述，可能是「黑星病」(Scab)，病原菌可以寄生在當地香瓜、胡瓜、甜瓜、冬瓜、西瓜、越瓜、南瓜扁蒲等，分生孢子之發芽範圍為攝氏一五至三〇度，適溫為攝氏二〇度左右，菌系的發育適溫為攝氏二〇至二八度。

病原菌除由種子傳染之外，另可附著葉傳播。病斑上的分子孢子飛散時，也能傳播本病，其侵入部位為表皮細胞縫合部，冷涼多濕的天氣繼續二三天時容易發生，特別是嘉義以南，本病之發生較烈。通風不良的土地也容易發生。其防除方法①將種子浸漬一千倍的烏斯普龍或其水銀劑液一小時(六〇分)後播種。②肥料施用不可偏用氮素，應併用磷酸、鉀肥。③在發病初期噴射「リイズン」(euizun)三百至四百倍，液須每

隔三—四天噴射一次，噴射時須注意該藥劑會影響鼻腔的粘膜。④收穫後將葉集中燒却。

推行共同育苗

節省黃麻種子



【問】：本地所種黃麻，歷年常因受颱風侵襲，很難留種，是否有較好的補救辦法？種子商常把黃麻的新舊種子混合出售，在購買時應如何鑑別？(嘉義縣新港陳思恭)

【答】：一、本年本省黃麻生長後期，遭受颱風侵襲，採種量普遍減少，政府正規劃明年推行共同育苗移栽方法，以期節省種子量，有自願種泰國麻者，可登記申請配購種子，以確保麻受原料需要量，以上兩項補救辦法，均請就近向當地鄉鎮公所農會聯絡洽辦。二、黃麻種子不論新舊，祇要能發芽，對於以後纖維產量，並無差別，種子播種前，應先鑑定發芽率，以推算經濟合適之播種量，黃麻種子發芽率鑑定法，請參閱豐年九卷四期。(季景元)

讀者服務部小啓

張進富 陳清幸 連進興 孟昭元
 陳明輝 黃進春 廖 馨 高慶濤
 朱受田 翁水西 謝茂亭 黃宏榮
 浦文成 周文蔚 會熙徵 陳金發
 黎文進 林東山 魏隆煥

以上各位農友來函所詢的問題，已轉請專家解答，請等候本社的回信。

贈送 精美十彩月曆

敝行為酬謝愛用客戶，特精印十彩月曆一批，請備五〇〇公分噴肥大空袋兩只，或必淨藥粉空盒十只，即贈月曆一份。請向經銷商或直寄敝所交換均可。數量有限，交換期限至五十一年二月五日止逾期恕不贈送。



劑除驅蟲蛔豬 靠可全安1095%95%力效

新包裝

促進發育 增卵防病

肥快大快 病疾預防

可樂與加裕 (コロイカル)

家禽、家畜、蛋魚、營養飼料素、強壯保健劑

製造元 白石カルシウム株式會社

強力安雞素 (ノキサリン)

鴨之球蟲症治療及預防家禽霍亂(コレラ)之預防
 鴨之感冒咳嗽治療，豬之赤痢(出血性下痢性)

強力寧禽片 (ヘルミノック錠)

出品廠 大和化學工業株式會社東京工場

美耐元 (ミネゲン)

理想的綜合強力礦物素、強健多產、激減廢糞、促進發育、預防啄毛、防止腳弱、防止軟破卵

製造元名古屋 ミネラル飼料株式會社

日本原裝魚粉蛋白質成分50%，南美洲65%以上

日本魚精、切菜機、鷄糞乾燥機

臺灣總代理 **東盈實業** 股份有限公司

地址：臺北市迪化街1段42號