

，並應施藥防治潛伏的害蟲。

(5) 疏播：少施氮肥。適時移秧。秧田播種量，每坪不要超過四合。肥料三要素要配合適當，不要多施氮肥。秧苗要適時移植，不要延長秧苗期。

(6) 注意灌排水。早秧田容易引起苗期熱病（早稻熱病）、苗徒長病等，但是排水不良時容易發生苗腐敗病，所以，灌排水應予調節。灌漑冷水的地方，應使水溝彎曲，拉長水流距離，提高水溫，防止冷稻熱病發生。

(7) 拔除病苗。稻苗徒長病的秧苗，比健苗長二倍，應於插秧前拔除。稻熱病、胡麻葉枯病、腐敗病的病苗及發育不良的秧苗，不要供為插秧用。

(8) 驅除媒介害蟲。黑尾浮塵子能傳播稻黃萎病，並且病菌極易由害蟲為害的傷口侵入，應澈底防治秧田時期的害蟲。

(9) 施用藥劑。假使已經發病，但又必須供為插秧之用時，應於插秧前施用西藥生石灰（每分地三至四公斤）或富米農片劑（每片加水十公升，

義嘉 清河冬春季優良種子

早春35天結球白菜 白木耳種菌
(包心) 請看相片 厚木耳種菌
長岡一號結球白菜 香菇種菌
長岡理想結球白菜 新品種晚生花椰菜
長岡一號甘藍菜 苗
日本黑葉美島大橋 粗廣北蔥子
(雜草) メロン型梨仔瓜子
長岡配福壽一號ト
美國派遜ト
晚生白菜骨片菜
九子無刺高脚波發
全年開花白菜
白脚菜
海湖西瓜子
牛脚菜
尖葉應菜子
烏龍大號應菜子
仙草種子
青粉色冬瓜子
白粉色冬瓜子
苦瓜子(平頭粗米)
金瓜子(南瓜)
蘇香種矮脚木瓜
日本九葉山東白菜
(一條條)
日本切葉白菜
日本半結球白菜
日本雪白體菜
紅仁白莖二尺半長
菜豆
黑仁青莖菜豆(綠帶尾)
八十天油甘菜
青江白菜
美國大心高莖
美國大五寸人參
黑仁敏豆
南洋田青子
相思蠟子

每分地噴射八十公升)，以免將病菌帶到本田。
為防止越冬害蟲飛來秧田產卵及為害，應在播種後十五天左右，即秧苗約五公分長時，噴射二五% DDT乳劑五百倍液，或一〇% DDT粉，或一五% BHC粉劑等一次。插秧前三天再施用一次。每分地液劑用八十公升，粉劑三至四公升。如為預防稻黃萎病而要殺滅黑尾浮塵子，則應噴射DDT或五〇%賽文可濕性粉劑一千倍液或一五%賽文粉劑。

最好設置共同秧田

為了便利管理及病蟲害的防治，最好設置共同秧田，儘量統一栽培品種及種植時期，這樣對實施稻種消毒及以後在本田期的病蟲害共同防治工作，也有很大的幫助，此外又可避免因栽培期不同而遭受病蟲或鳥類集中為害的危險。
秧苗的好壞，對將來稻谷收成影響很大，請各位農友好好地防治秧田期的病蟲害，育成強健的秧苗。

敝行之早春35天包心白菜(點播55天)於五十年經驗結果自農曆一月十八日起二月上旬止均可下種栽培，成績良好，今年之栽培期間，自農曆一月十五日起二月上旬止均可下種栽培，過去有栽培過的農友都異口同聲稱讚，故請要栽植的農友勿失良機提早訂購，為幸。
右記各色種子，在庫均備其它各色種子，請照會農藥類，殺蟲劑及大生22大生78可利生均有歡迎陽顧為荷。

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四
劃儲金嘉字八〇〇三七號

◎再出現一種新穎的微量元素綜合劑!!

葉綠元 液劑

(葉面撒布劑)

中央標準局註冊備案 Chlorophygen-M62

·葉綠元之特點·

- ①促進植物生長及增加產量。
- ②加強葉、莖、根、增加養分吸收力。
- ③促進落葉，若果提早成熟期。
- ④防止黃萎病，紋枯病及抵抗稻熱病等之病害。
- ⑤使葉莖之色彩鮮艷壯大。
- ⑥使用本劑可節省肥料施用。
- ⑦使用葉綠元可增加收成一成至三成。

最新驚人的植物ホルモン劑已出現!!

純粹一植物生長綜合賀爾蒙劑一高單位
保證品質 一滴顯效

快豐收 液劑

中央標準局註冊商標第12718號

AUXIN—H61

·快豐收之特點·

- ①增加作物體之生長落葉之速度並促進成熟期
- ②防止落葉果改良品質增加產量提早收成
- ③增加發芽率促進活力
- ④抵抗病蟲害並防止稻熱病等發生
- ⑤增加產量二成至六成
- ⑥快豐收品質絕對與他貨大不相同

製造廠
廠址

神農化工廠出品
南投縣名間鄉濁水村39號