培上應注意那些事？（南投縣國姓鄉何阿秀）

【答】：亞拉伯種咖啡的品質極為優良，每公斤乾咖啡豆約四十五元，這種咖啡每年於一至五月每逢下雨後開花，以二至四月開花最多，因開花次數好幾次，故果實成熟期亦不整齊，普通採收期為九至十二月，以十月為最主要的採收期，果實紅色時才可以採收，本種品質優良，但易感染銹病，應常常噴射八—八式波爾多液以防治之。（朱慶國）

## 紅甘蔗大培土施用含氮肥料



【問】：紅甘蔗大培土時要施用那幾種肥料？施用量多少？紅甘蔗每分地三要素的施用量應如何配合？可以混合施用嗎？如施用尿素以何時較好？（南投國姓彭天生）

【答】：一、紅甘蔗係需肥量之長期作物，磷鉀肥宜於早期施用，故於大培土時施含氮肥料即可，如尿素硫酸銨，氰氮化鈣等均可。二、每分地施肥量，視土地之肥沃程度而不同。普通壤土地每分地肥料三要素量為氮肥十八公斤，磷肥七五公斤，鉀肥十二公斤，三要素混合施用為宜，但肥料性質不可混合者單獨施用亦可。三、尿素較早期施用可促進幼蔗生長，減少蔗株旁邊雜草之發生，故宜於第一次除草時施用。（李寬命）

## 檳榔間作文旦施肥不大方便

【問】：敝人現有檳榔四百株，株行距各為九臺尺，現欲再間作文旦，可以嗎？文旦需要何種土質？怎樣施肥？（臺南縣新市蔡貞奇）

【答】：一、如果你將檳榔栽培在田裏，不是在田邊埂上，就土地利用言，與文旦可以混植，不過因檳榔根堅硬粗壯，容易伸張，對文旦開溝施肥時有所不便，可能益多害少，可改條施法，或等到文旦長大起來，全園施肥，就不會有上述困難。二、文旦所需土質以輕粘土或沙壤土稍帶酸性為宜，山坡平地都可栽植，每年分二，五，十各月施肥，除用化學肥料氮肥外，仍多施鉀肥與適量磷肥，另外堆肥也不可缺少。三、依你所說檳榔九尺四方形栽植，中間再栽一株文旦，距離過狹，應該採取隔一株三角形交互栽植，其株距即可放寬。（王兆全）

## 球莖甘藍不宜連作



【問】：金門早生球莖落藍的種子到何種程度時才可以採收留種？採種後如何貯藏？球莖甘藍可以連作嗎？（臺中神岡鄉朱琴）

【答】：一、球莖甘藍的種莢可於黃熟後開始採收，過遲種子易由種莢脫落，普通檢查頂部的莢內種子是否已變淡褐色，若已變淡褐色可以採收，其時的莢色雖尚在青綠階段，但種子已有發芽能力，採收後宜懸垂於屋簷下或室內，予以追熟並風乾，或經過追熟後放在雨篷布或塑膠布篷陽乾，種子漸次由莢脫落，至水分減少到約十一至十二%時再予精選。二、將種子裝入塑膠布袋並密封後，放入木桶貯藏。少量時可以裝入酒瓶並用木栓密封或裝入紙袋或布袋後放在乾燥器貯藏。三、球莖甘藍經常容易發生根朽病及細菌病等，故最好不要連作，但若其後作為水稻，不妨連作。（王進生）

## 葡萄不甜原因很多



【問】：敝人種植葡萄 Golden Muscat 品種，果穗和果粒的發育都很好，只是糖分很低，有何補救辦法？施用雞糞有用嗎？（彰化市白錫珍）

【答】：一、Golden Muscat 品種，在本省試種結果，糖份可達十八度；影響葡萄


養雞界福音！
雞白痢預防・治療特效藥出現了！
每隻雛雞飼銀一個月僅花一元代價即可保證預防白痢而且可促進發育!!
英國卜內門公司榮譽出品
ICI
'Furella'
'フレラ'
'福利來'
防治雞白痢
雞傷寒及其他家禽疾病特效新藥
包裝：22瓦
100瓦　450瓦
用法：預防法……配合飼料448倍供飼餵
治療法……配合飼料112倍飼餵十天
（說明書函索即寄）
總代理：英商卜內邁有限公司
臺北市中正路一八〇〇號　電話：二六六九〇
經銷處：永生西藥行
臺北市中山北路一段一二四號　電話四二四七六





NA
豐收牌巴拉松 PARATHION 50
HARVEST
豐收牌馬拉松 MALATHION 50
誠徵各地經銷處
現貨大量供應
大生二十二，大生七十八
可利生殺菌劑
250cc, 500cc, 1000cc, 鋁瓦原裝





升泰雅地斯生物化學藥廠出品
Nordisk Alkali Biokemi Ltd
臺灣總代理
永興貿易行
本行：彰化市中正路三六三號
連絡處：臺北市南京西路六十二號
電話：911, 1079
電話：43356, 45811