
應用新藥劑，驅除豬蛔蟲！



劉永和

本省過去常用的豬蛔蟲驅除藥劑，都是用「氟化鈉」爲主要成份配成的。「氟化鈉」價格低廉，對豬蛔蟲的驅除效果也很好，可是它需要分數次投藥，並容易引起嘔吐等副作用，所以不是理想的驅蟲劑。豐林廳和省農會，現在推廣一種叫做「比配拉淨」的新驅蟲藥劑，只需投藥一次，即可達成驅蟲的目的，不發生任何副作用，同時，因爲沒有不愉快的氣味，大豬小豬都容易服用。

農友們養豬，最怕豬瘟與豬丹毒，但是對於豬蛔蟲的爲害，却很少加以注意。

所以如此，是因爲豬一旦得了豬瘟或豬丹毒，必定即時發生顯明的病徵，而豬蛔蟲寄生的初期，並不顯示任何促人注意的症狀。

其實，豬蛔蟲引起的損失，並不比豬瘟或豬丹毒輕微，只不過因爲它是在你不知不覺中爲害，使你無法察覺罷了。

發生普遍・爲害嚴重

據調查，本省豬蛔蟲的寄生率，高達百分之六十至七十，種母豬的寄生率，恐怕還不止此數。

寄生有豬蛔蟲的種母豬，經常隨着糞便排出蟲卵，因此，小豬出生後，立即由母豬乳頭感染蛔蟲卵。

經小豬攝食的蛔蟲卵，一到腸胃後，很快就孵化成爲仔蛔蟲。

這些仔蛔蟲，爲了完成發育，開始穿過腸胃壁，經肝臟、橫隔膜而至肺部。或穿入腸壁血管、淋巴管、肝臟後，沿靜脈管經心臟而至肺部。

仔蟲到肺部後，會暫時寄生於肺部，完成一段發育，然後經氣管、食道再回到腸管成熟爲成蟲。

因此，有蛔蟲寄生的豬，常呈食慾不振、消化不良、疝痛、痙攣、咳嗽等症狀，並且很容易發生肺炎、肝炎、腹膜炎、生育障碍等病而死亡。

在多種豬病中，最麻煩而且最使獸醫們頭痛的，是慢性肺炎。

病菌、病毒之感染，豬舍設備或環境衞生不佳，氣候的突變，管理失宜等，是引起慢性肺炎的重要原因或誘因，但是據筆者在本省各地調查的結果，發現由豬蛔蟲寄生而誘發的，竟佔最大的比率。

所以，從慢性肺炎的防治上來講，蛔蟲的驅除工作，也是很重要的。

使用新藥・方便效大

本省過去常用的蛔蟲驅除藥劑，都是用「氟化鈉」爲主要成分配成的。

這種驅蟲藥，價格低廉，對豬蛔蟲的驅除效果也很好，可是因爲需要分數次投藥，而且混在熱的液狀飼料餵給時容易引起嘔吐等副作用，並不是理想的驅蟲劑。

爲了這個原因，農林廳和省農會，已於去年度起，推廣一種叫做「比配拉淨」的驅蟲藥劑。

這種新藥，可溶於液狀飼料中餵給，只需投藥一次，即可達成驅蟲的目的，不發生任何副作用，同時，因爲沒有不愉快的氣味，大豬小豬都容易服用。

你希望養豬事業有更大的收益嗎？請向各鄉鎮農會購買「比配拉淨」來驅除豬蛔蟲！

驅蟲時期，肉豬在幼小時施行，種母豬可在仔豬斷乳後施行。

防止蔓延・注意三點

可是，如上面所述，豬蛔蟲的傳染力很強，所以除了應用藥劑驅蟲外，還應注意下列幾點，以免健康的豬群再受感染：

（1）豬舍地面應鋪水泥，並且按期舉行火焰消毒（本省部分鄉鎮農會備有火焰消毒器供用），或開水消毒；但是在投藥驅蟲後實施才有意義。

（2）以豬糞尿做追肥的蔬菜、甘藷蔓等，不能用來生飼。

（3）種母豬尤須澈底驅蟲，豬舍也須常行消毒，保持清潔。

△農業小知識▽

△母豬懷孕期間飼養管理不得當，尤其在營養不良時，可能產生無毛小豬。（季）

△未老化的四川芥菜葉子，可以加工製成「菜葉乾」或「鹹菜」。採收時期以莖瘤未失光澤爲適當（陳）

△過磷酸鈣受潮成泥狀，肥效是不會變的，只是使用起來不方便一點。（吳）

△龍鬚菜是一種海藻，由莖部葉部吸取水中養料而生長。養殖時祇要按時採取胞子於竹枝或繩索，將此竹枝或繩索懸垂於海水中即可。（唐）

△龍鬚菜的主要用途，是作「洋菜」。洋菜在食品工業，細菌培養，及黏着劑製造上，用途很大。（唐）

農業廣播消息

△屏東民立臺（週率一〇五〇千週）「快樂農村」節目，播出時間爲每星期一—六下午八時三十五分至九時。

△草屯中興臺「農村服務」節目已經取消。