

大葉桉作防風林
應定期剪定切根



植大葉桉樹作為防風林時，至少應種幾行，才有防風效果？要

林的成長會奪取柑桔所需的肥分嗎？（北投史雲亭）

【答】：一、柑桔防風林之設置，以一系列植為普通，但大葉桉樹因植株下方缺少枝條可防風，最好在桉樹株間再植灌木狀防風樹木，防風林之密度，因地形、風速而異，一般在平地時，四公尺高之防風林有二十五至三十三公尺遠之防風效果。二、大葉桉樹生長迅速，生長過高後，其本身亦易受風害，故到達理想高度以後，需剪定，以抑制生長，促進側枝之發育，加強防風效果。三、每隔三年，須在園內防風林之一邊挖掘深溝，切斷防風樹木之根群，以防與柑桔競爭養份。（翁仁祿）

臺中種甜瓜·三四月播種


【問】：甜瓜的別名就是梨仔瓜嗎？臺中市附近可種甜瓜嗎？什麼品種最好？種後多久可以收穫？怎樣防治瓜實黴？（臺中縣太平鄉林樹木）

【答】：一、甜瓜的別名在本省叫做梨仔瓜，因本省大部分都栽培「梨瓜」種。二、臺中市附近可以栽植，其播種期與越瓜相同

來信請用明信片
信中免寫客氣話
書明姓名和住址
信封上註「農問」

，即二月至十月之間均可栽培。三、適於本省栽培的品種，計有梨瓜 New Market (新甜瓜)，及黃香瓜。四、播種後約六十至七十天就可收穫，三至八月播種者須於雌花開花時，噴射二五%可濕性馬拉松粉劑與水溶性蛋白質四百倍混合液，以防除瓜實黴。在貴地三至四月播種者產量最高。（王進生）

葡萄果穗·不應套袋



【問】：葡萄的灌木整枝法是怎樣的？葡萄果穗可否用套袋方法來防止害蟲侵入？（臺南市水交社張浩淵）

【答】：一、葡萄的灌木整枝法，請將你所有葡萄株之主幹長，枝條長及枝條數等作成詳細記錄後，直接寫信向臺灣大學園藝系康有德先生請教。二、葡萄果穗不應採用塑膠袋來套，塑膠袋雖可避免害蟲進入，但袋內濕度過高，受強烈日照射後，易使袋內果實腐爛或落果。（翁仁祿）

野生姑婆芋的用途

【問】：野生的「姑婆芋」有何用途？含何種成分？怎樣繁殖？可以大量生產嗎？（基隆市葉崇宗）

【答】：一、野生「姑婆芋」在本省山地自生，它的用途可分為：①飼料用：葉柄和

鮮度保持劑(青果·蔬菜類等)
生果青菜外銷不可缺少之鮮度保持劑。
(日本食品衛生法指定品)

富麗鮮 Fresher



▲特效及用途

- ◎防止萎凋及重量減少。
- ◎保持如收穫時所有的天然外觀鮮度。
- ◎防止過熱所受損失，延長貯藏期間。
- ◎防止發生青黴及腐敗傳染於其他果菜。
- ◎減少運送中，青果類蔬菜等等之擦傷之皮面的損傷。
- ◎一般果類，例如柑桔、香蕉等之鮮度保持。

說明書備索

世界首創！植物蒸散抑制劑
現代農業不可缺少之營農資材。
日本「不二合成」榮譽出品
(專賣特許發明協會選定品)

久綠拿 Greener



經臺北縣政府農業課於去年炎熱的六月，以本劑一公升處理一千採柑苗，移植於縣下各派出所，全部成活。

▲特效及用途

- ◎防止稚幼植物，在移植時枯萎凋謝。
- ◎使苗木在長途運送，活生生得送到種植地。
- ◎使青菜，生果類保持鮮度。(現有姊妹品富麗鮮專用)
- ◎防止蔬菜、青果、菸草、水稻、陸稻等一切農作物，在移植時的損害及枯死，同時促進最高成活率。
- ◎保護植物不受旱害、霜害、鹽害等。
- ◎加強植物其他農藥噴射的附着力。

製造元：不二合成株式會社
輸出元：株式會社永順商會
臺灣總代理：永友商會

東京都豐島區日町3の149
電話(971)9769 (983)1603
東京都千代田區神田陳松松
下町三五電話(291)877
臺北市中正路1961號之四
電話：36767

◎東京「不二合成株式會社」及「株式會社永順商會」駐臺代表處：臺北郵箱1770號