

芋頭可作為豬的飼料，但必須充分煮熟才行。
②包裝用：橢圓形的葉適於包裝蔬菜（豌豆、菜豆、荸薺）及魚類等。

二、里芋含有大量的澱粉，但「姑婆芋」更含有大量的澱粉，所以粘性強。

三、姑婆芋自生於溪谷的陰處，中央山脈地區的目的者不少，它的乾葉除了可作飼料外，還可作為工業漿糊。

四、繁殖方法非常簡單，將芋頭分開（分株），每隔一公尺栽植一株。如果在腐植質的土壤上，更可促進其生育。其經濟價值視市場之需要而定，目前不敢判定。（王進生）

香蕉的葉面施肥



【問】：敝人所種香蕉，因受颱風影響，發育不大正常，聽說使用葉面施肥，可以恢復植株的元氣。此說是否可靠？何種肥料可以用作葉面施肥？

高雄旗山吳英波

【答】：一、香蕉使用葉面施肥，在中南美洲已普遍應用，效果甚佳，應用之肥料為尿素，其濃度為一：一三〇，即一分之尿素加水一三〇公分，每三至四禮拜行葉面施肥一次，但所應用之尿素，其所含之二腺酸應以不超過一%為優。（朱慶國）

梨山和霧社，可種除蟲菊

【問】：除蟲菊除作殺蟲劑外，還有何種用途？有無特殊經濟價值？在中部應栽培那一個品種？有人要收購嗎？（彰化秀水鄉林長坑）

【答】：除蟲菊專用以防治家庭及人畜害蟲，別無用途，能殺蟲之除蟲菊均為白花除蟲菊，此菊適宜於寒地栽培，本省在梨山（福壽山）及霧社已推廣過，但因無人收購乾花，故至今日，尚未成為企業化。而且有了人造除蟲菊之後，白花除蟲菊也無法與之競爭。貴地如在一千公尺以上而日照長者，可以試栽，否則不會成功。（陶家駒）

暹羅種水稻的栽培



維美濃蕭政彰

【問】：高雄地區所種的暹羅種在來種，應施用何種和多少肥料？施肥方法如何？如何提高其產量及提早其成熟期？（高雄）

【答】：水稻暹羅種在來種，是第二期的優良在來種。在高雄區第二期栽培時，適當的化學肥料種類及用量如下：硫酸銨每公頃三〇〇至四〇〇公斤（尿素一五〇—二〇〇公斤）、過磷酸鈣每公頃二〇〇—至二五〇公斤、氯化鉀五〇至六七〇公斤。硫酸銨應使用三百或四百公斤，要看土壤的肥瘠而決定之。肥料的使用法：鉀肥全量用做基肥，於插秧前整地時施入。氮肥及磷肥各半量，於整地時與鉀肥同時施入做基肥。剩餘的一半，再分為兩份，分別於第一次及第二次除草時做追肥施用之。（例如假定氮肥每公頃要使用四百公斤，即其中二百公斤做基肥，剩餘二百公斤，於第一次除草時，施用一百公斤為第一次追肥，於第二次除草時再施用一百公斤為第二次追肥之用。）

為了提高產量，品質及提早成熟，應注意下列幾點：一、肥料三要素用量配合要適當，不可單施氮肥肥料。二、增加鉀肥用量，可促進早熟，並可提高品質。三、肥料用期要適宜。例如應施基肥外，追肥應於第二次除草前使用完畢。四、灌排水管理方面，平常田面保持淺水，並行晒田。在開花抽穗期需注意灌水，絕不可斷水（欠水）。五、注意病蟲害預防。（謝英傑）

繁殖柑橘，切接最好

【問】：廣東大紅年桔的實生苗，經種植六七年後，所結果實甚小，應如何恢復其樹勢？何種砧木與廣東大紅年桔相接，最為理想，青梅與桃李的種子，何時可以播種？又枇杷和檸檬應在何時移植？（九龍草園農場阮甘泉）

五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市中正路1791號二樓
電話：31691
工廠：北基公路七堵草湳站旁
電話：七堵36號



五蜂商標


三、本公司另又依照歐美配方，配製巴拉松，馬拉松，安特靈，馬巴（PM）乳劑，安巴乳劑，克羅米，西樂生石灰等各種乳劑粉劑，成分準確，藥效強大，行銷全省，信用卓著。



利農乳劑 20%

DIAZINON E.C. 250 c.c.
O, O-dialthyl o-isopropyl 1-methyl
pyrimido-phosphate 80%
Remainder emulsifier and solvents 40%

二、本公司與瑞士嘉基公司技術合作，由該公司供給原料及配方，調製二〇%大利農乳劑，本劑不但能撲滅農作物害蟲尤其對於家庭環境衛生上之害蟲，如臭蟲蚊蠅等有驅除消滅之特效。



1000 c.c.
Folidol-E605
conc.

146 7% Diethyl para-nitrophenyl phosphorite
is a spraying agent
for the control of sucking and chewing
insects in farms, gardens and orchards
and on cotton and other plants.

POISON! POISON!

To be kept in a safe place

一、本公司與西德拜耳藥廠，以技術合作方式，在臺獨家配製世界聞名之農用殺蟲藥富粒多乳劑 Folidol-E605 本劑與西德原裝富粒多品質藥效完全無異。